

Clobetasol 17-propionat 外用藥膏衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Clobetasol 17-propionate	Clobetasol ointment	可立舒軟膏	0.05%, 25g/條

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

濕疹、癢疹、日光皮膚炎、指掌角皮症(富貴手)、掌蹠膿疱症、苔癬化、乾癬(銀屑病)。

◆ **用量與用法：**

1. 詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示，勿超過建議使用量或使用次數。
2. 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
3. 適量塗抹於患部。

*藥效很強，**擦薄薄一層**能覆蓋患部就好，不要像塗面霜一樣厚。

4. 用於臉部及頸部治療時，僅能作短時性使用，以免皮膚呈現萎縮現象。
5. 本藥限於外用不得內服

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**[可立舒軟膏為強效類固醇藥膏]

1. 對本劑過敏者禁止使用。
2. 1歲以下幼兒之皮膚病(如皮膚炎及尿布疹)不要用。
3. 皮膚有結核、單純疱疹、水痘、帶狀疱疹、種痘疹(如接種牛痘疫苗後，出現紅腫、水泡、膿疱，甚至潰瘍)，應禁止使用。
4. 患有酒渣鼻、尋常性痤瘡(青春痘、粉刺)、口圍皮膚炎、肛門及生殖器搔癢症、無發炎反應的搔癢症不要用。

◆ **藥品儲存：**

1. 請儲存於室溫 25°C 以下陰涼處。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。

◆ **注意事項：**

1. 當使用本藥可立舒時，如有皮膚感染症狀，應搭配抗菌劑或抗真菌藥使用，若還是沒有改善，宜暫停可立舒軟膏，待感染的皮膚獲得控制後再行使用。
2. 本藥膏最多只能連續使用四週。如果擦了一個月皮膚還沒完全好，請務必回診讓醫生檢查，決定是否要換藥或停藥。
3. 眼臉皮膚使用時，應注意不要大量且長期使用，以免引起眼壓亢進，增加青光眼或白內障的風險。
4. 嬰兒及小兒應避免長期使用本劑，以免發生其副腎之壓抑作用，影響發育和身高。
5. 長期連續或不當使用局部皮質類固醇類藥品，停用後會導致局部類固醇戒斷反應。應立刻回診讓醫師調整用藥，可採階梯式停藥。

◆ **可能引起的副作用：**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

*嚴重過敏反應：塗抹處出現劇烈搔癢、異常紅腫、或大面積冒出小水泡。

*疑似細菌感染：患部出現滲膿、發臭、劇烈灼熱刺痛感，或紅腫範圍快速向外擴散。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/4/8 修訂】

BTC00EW31-02

Clobetasol 17-propionat 外用藥膏衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Clobetasol 17-propionate	Clobetasol ointment	可立舒軟膏	0.05%, 25g/條

*長期損傷(需警惕): 皮膚變薄(呈現紙樣透明感)、出現紅血絲(微血管擴張)、皮膚萎縮紋, 這代表因為擦藥太久而變質。

2. 如以下症狀嚴重且持續時, 請告知醫師

*局部皮膚刺激及灼熱感、皮膚癢、刺痛。



無私奉獻・謙卑服務

該藥品的資訊無法全部列出, 若您有任何藥物使用的問題, 請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線: 26723456 轉 7034、7150。【2026/4/8 修訂】

BTC00EW31-02