

Silver sulfadiazine 外用藥膏衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Silver sulfadiazine	Silvadene 20g cream	使立復乳膏 20 公克	1%, 20 克/管

◆ **用途：**（一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡）

1. 二級與三級燙傷之預防感染。燙傷及一般外傷傷口的感染和皮膚黏膜的感染。

◆ **用量與用法：**

1. 傷口清潔後，將本品塗於患處，每天 1 至 2 次。

2. 可使用紗布覆蓋傷口，避免陽光直射塗藥部位，以防皮膚暫時性色素沉著。

3. 塗抹後，傷口表面可能會形成一層灰白色的薄膜，這是藥物與傷口滲液反應後的正常現象，不代表傷口惡化。

4. 請遵循醫師指示使用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對磺胺類藥物過敏者請告知醫師。

2. 通常禁用於足月孕婦或 2 個月以下的新生兒，因為會增加「核黃疸」的風險。

3. 蠶豆症患者 (G6PD 缺乏症) 禁用。

4. 此藥僅限外部傷口使用，不可接觸眼睛。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快使用；若接近下次使用時間，按時使用即可。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光保存，銀鹽接觸光線後容易變色（變黑或變深）。

2. 避濕及避熱。

3. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 若出現皮膚紅腫、劇烈疼痛、不明原因發燒或黏膜潰爛，請立即停藥並就醫，這可能是嚴重的過敏反應。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，應立即就醫：

*藥物反應症候像搔癢、發紅、腫脹、丘疹、小水疱出現時，應中止使用並諮詢醫師。