

Betamethasone, Gentamicin, Tolnaftate,
Iodochlorhydroxyquin 外用藥膏衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Betamethasone, Gentamicin, Tolnaftate, Iodochlorhydroxyquin.	Scheree cream	四益乳膏	7 克/管

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
急救、預防及減緩皮膚刀傷、刮傷、燙傷之感染；治療皮膚表淺性黴菌感染，如足癬(香港腳)、股癬、汗斑；溼疹或皮膚炎。

*本藥膏結合了類固醇、抗生素、抗黴菌劑與抗原蟲的四合一複方藥。

- ◆ **用量與用法：**

1. 使用部位或其周圍有髒污時，請先洗乾淨後再用藥。每天使用 2-3 次。
2. **使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。**
3. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
4. 一般黴菌治療 7 天症狀會改善、股癬和體癬為 2 週，足癬為 4 週，如經過前述治療時間，症狀若沒有改善，則應停藥立即就醫。若因症狀改善而停藥，之後病情如復發應就醫。

- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 皮膚結核、急性單純疱疹、天花、水痘。
2. 此藥僅限外部傷口使用，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)，浸潤、潰爛、龜裂或嚴重外傷的患部。
3. 曾因本藥成分引起過敏的人。

- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快使用；若接近下次用藥時間，按時使用即可。

- ◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光保存，避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

- ◆ **注意事項：**

1. 若出現皮膚紅腫、劇烈疼痛、不明原因發燒或黏膜潰爛，請立即停藥並就醫，這可能是嚴重的過敏反應。
2. 本藥**勿使用於大面積之體表**(以使用者的兩手掌面積作為參考)。
3. 注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立刻前往眼科就醫。
4. 請勿使用在患部以外，也勿當作預防使用。
5. 小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群(如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等)及腎上腺功能障礙(如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等)，請立即停止使用，並諮詢醫生。
6. **皮膚變薄(萎縮)與明顯紅血絲(毛細管擴張)是類固醇最典型的長期副作用**，這類損傷通常是不可逆的。請務必遵照醫囑使用，**千萬不可將此藥膏當成保養品天天擦**；若發現患部皮膚開始發亮、變薄或長出痘痘、毛髮，請**立即停藥並回診調整**。

- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/4/8 修訂】

BTC00EW34-02

Betamethasone, Gentamicin, Tolnaftate,
Iodochlorhydroxyquin 外用藥膏衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Betamethasone, Gentamicin, Tolnaftate, Iodochlorhydroxyquin.	Scheree cream	四益乳膏	7克/管

1. 如發生以下症狀時，應立即就醫

- *過敏性皮膚炎：如紅、腫、水泡、脫皮、搔癢等。
- *新的細菌/黴菌感染：傷口開始流膿、發臭、紅腫範圍快速擴大。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫生

- *皮膚萎縮(變薄發亮)、毛細管擴張(明顯血絲)、多毛症、皮膚濕軟、青春痘、毛囊炎。
- *局部輕微刺痛、短暫灼熱感、痂子(通常與藥膏太油或包覆太緊有關)。



無私奉獻 · 謙卑服務

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/4/8 修訂】

BTC00EW34-02