

Silver sulfadiazine 外用藥膏衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Silver sulfadiazine	Silverzine【500g】cream	燙傷舒乳膏【500g】	1%, 500 克/瓶

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
局部預防及治療二級、三級燒傷的傷口化膿。
- ◆ **用量與用法：**
 1. **灼傷治療時 1 日 1~2 次。**先清潔患處後，以無菌之手套塗敷本劑，患部必須塗佈完全並達 **2~3mm 厚**，在塗敷本劑後不必馬上裹上紗布(防止敷料與傷口黏連造成二次傷害)，第二天將前日的乳膏以溫水洗掉，再繼續塗敷治療，應繼續直到出現治療效果，以免患部未完全痊癒，會有再感染之可能。
 2. **其他一般感染症**，以適量塗敷，每日 1 至數次。
 3. **建議使用紗布覆蓋傷口，並避免陽光直射塗藥部位**，以防皮膚**暫時性**色素沉著。
 4. 塗抹後，傷口表面可能會形成一層灰白色的薄膜，這是藥物與傷口滲液反應後的正常現象，不代表傷口惡化。
 5. 請遵循醫師指示使用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 曾對磺胺藥過敏，光線過敏，肝或腎功能障礙患者應慎重使用。
 2. **蠶豆症患者 (G6PD 缺乏症) 禁用。**
 3. 通常**禁用於足月孕婦或 2 個月以下的新生兒**，因為會增加「核黃疸」的風險。
 4. 此藥僅限外部傷口使用，不可接觸眼睛。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
 1. 想起時儘快使用；若接近下次用藥時間，按時使用即可。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光保存，銀鹽接觸光線後容易變色(變黑或變深)。
 2. 避濕及避熱。
 3. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 若出現皮膚紅腫、劇烈疼痛、不明原因發燒或黏膜潰爛，請立即停藥並就醫，這可能是嚴重的過敏反應。
 2. 本品為 500g 大容量罐裝，建議每次取用時使用「無菌棉棒或藥鏟」，避免手指直接接觸整罐藥膏，以降低整瓶污染的風險。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. **如發生以下症狀時，應立即就醫：**
 - *藥物反應症候像搔癢、發紅、腫脹、丘疹、小水疱出現時，應中止使用並諮詢醫師。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/4/8 修訂】

BTC00EW35-02