

Sertaconazole nitrate 外用乳膏衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Sertaconazole nitrate	Zalain Cream®	達來乳膏	2%, 15 克/條

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療皮膚表面黴菌感染。例如：足癬、股癬、圓癬、鬚癬、手癬、念珠菌、變色糠疹。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示使用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

2. 塗藥前應先清潔患部並徹底擦乾，因為黴菌喜好潮濕環境。

3. 一天 1-2 次(最好是晚上或早、晚各使用一次)，均勻塗在患部及周圍約 1 公分。

4. 一般而言，完整療程是四週，不會再有復發情形發生。然而，大部分患者在治療 2 - 4 週期間，就已有臨床修復現象出現。所以，即使症狀改善，也請用滿療程，要不無法根除。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 不可用於眼部治療。

2. 如果曾經對「-conazole」結尾的抗真菌藥過敏就得注意對此是否過敏。如對達來乳膏藥效成分或賦形劑過敏就不宜使用。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快補擦即可；若已接近下次使用時間，則跳過本次，依原時間使用即可。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 保持乾爽：塗藥前應先清潔患部並徹底擦乾，因為黴菌喜好潮濕環境。

2. 避免包覆：除非醫生指示，否則塗藥後請勿用保鮮膜、緊繃繃帶大面積覆蓋，以免增加皮膚刺激或副作用。

3. 清潔雙手：塗藥前後皆應洗淨雙手。若事後需戴隱形眼鏡，務必先徹底洗手，避免藥物殘留接觸眼睛。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，應立即就醫

*若塗抹處出現異常劇烈搔癢、水泡或紅腫範圍擴散，請立即停藥洗淨。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫生

*輕微紅腫之局部反應。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/4/8 修訂】

BTC00EW36-02