

Abiraterone acetate 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Abiraterone acetate	Zytiga®	澤珂錠	250 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
治療治療前列腺癌。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師處方與指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 必須空腹服用，故服用本品前應至少 2 小時不可進食，服用後也應至少 1 小時不可進食。
**食物(特別是油脂)會讓身體吸收過量的澤珂錠，會讓藥物在血液中的濃度飆升到原本的數倍。
3. 藥錠請勿壓碎或嚼碎，須整粒吞服。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

已知會對本藥過敏者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

**萬一不小心配了食物吃，請密切觀察是否有頭暈、心悸或水腫，視需要就醫。

◆ **藥品儲存：**

1. 請儲存於 30°C 以下室溫，避光、避濕、避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 一定會搭配類固醇(prednisone或prednisolone，像本院的康速龍錠)一起服用。
2. 服藥期間請定期回診監測肝功能，且確認是否出現高血壓、低血鉀及體液滯留等現象。
3. 本身具糖尿病且有在服用降血糖藥物者需注意：
因澤珂錠會讓某些降糖藥(像本院的glitits泌特穩、repaglinide柔糖錠)代謝變慢，然這些血糖藥就會在體內堆積，導致血糖降得太低，引發嚴重的低血糖症。
4. 看診時，請主動告訴醫師您是否有服用癲癇、結核病藥物。
5. 有具生育能力之女性伴侶的男性病人，在治療期間及投予最後 1 劑後的 3 週之內，應採取有效的避孕措施。
6. 已懷孕或可能懷孕的女性，不可在沒有防護措施(如手套)的情況下碰觸澤珂錠。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

*急性過敏反應：呼吸困難、蕁麻疹、呼吸急促、意識混亂。

*腎上腺危機：嚴重的腰背、腹部或腿部疼痛。嚴重嘔吐與腹瀉導致脫水。血壓極低(休克)。意識模糊或昏迷。

*肝功能變化：深色尿、灰白色糞便、皮膚或眼白泛黃等。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

*尿道感染、頭痛、發燒。周邊水腫、低血鉀、高血壓。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/4/13 修訂】

BTC00ED22-02