

## Alectinib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Alectinib	Alecensa <sup>®</sup>	安立適膠囊	150 毫克/膠囊

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

治療肺癌。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師處方與指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 應與食物併服，並整粒吞服，切勿打開膠囊或將膠囊內容物溶化使用。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 已知會對本藥過敏者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

如果漏服一劑，或是在服用一劑後發生嘔吐反應，應於排定的時間服用下一劑，不要額外多服一劑。

◆ **藥品儲存：**

1. 請儲存於 30°C 以下室溫，避光、避濕、避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 若出現新發生的『喘、乾咳、發燒』，可能是嚴重的間質性肺炎，請回診並由醫師診斷。
2. 服藥期間請定期回診監測肝功能。
3. 治療期間及停用後至少 7 天內要避免長時間曝曬陽光，並採取適當的防曬措施，如使用防曬乳液與護唇膏。
4. 具生育能力的女性病人，在治療期間應採取有效的避孕措施，在使用最後一劑之後亦應繼續避孕 5 週。
5. 有具生育能力之女性伴侶的男性病人，在治療期間應採取有效的避孕措施，在使用最後一劑之後亦應繼續避孕 3 個月。
6. 治療期間及使用最後一劑後的 1 週內不要餵哺母乳。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

\*急性過敏反應：呼吸困難、蕁麻疹、呼吸急促、意識混亂、嚴重皮膚不良反應。

\*肝功能變化：深色尿、灰白色糞便、皮膚或眼白泛黃等。

\*尿液顏色變化，尿量減少或腿和腳部腫脹。

\*心搏徐緩的症狀，包括暈眩、頭昏眼花、以及暈厥。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

\*不明原因及/或持續性的肌肉疼痛、觸痛或虛弱。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/4/14】

BTC00ED23-02