

## Afatinib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Afatinib	Giotrif®	妥復克膜衣錠	40 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)  
治療肺癌。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師處方與指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 不可與食物同時，服用本藥前至少 3 小時內與後 1 小時內都不要進食，應配以開水整粒吞服。
3. 若無法吞服整粒錠劑，可放入約 100 mL 飲用水中，不要壓碎，攪拌直到錠劑崩散成極小的顆粒(約 15 分鐘)後立即喝下此溶液，再以約 100 mL 水沖洗杯緣並喝下。
4. 此溶液也可用鼻胃管餵食。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 已知會對本藥過敏者。
2. 如果確診為間質性肺病(ILD)，即應永久停用妥復克膜衣錠。
3. 用藥期間發生胃腸道穿孔的病人，應中止治療。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

通常是 1 天 1 次的話，如忘記服用，應在同一天內想起時立刻補服該次劑量。若是離下次服藥時間已不到 8 小時，則直接跳過該次忘記服用的劑量。下回服用正常劑量即可，勿加倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存於 30°C 以下室溫，存放於原包裝中以避免受潮與光線照射。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 治療期間如曾有腹瀉(包括嚴重腹瀉)，需適當補充水分，並搭配止瀉劑(例如 loperamide)治療，得在首次腹瀉時就使用止瀉劑，並持續治療直到軟便情況已停止 12 小時。
2. 為預防光敏感，出門前請全副武裝，透過撐傘、穿長袖、塗抹防曬乳來躲避烈日，因為紫外線會大幅加重皮疹與紅腫不適。
3. 因可能會有甲溝炎，洗手後務必擦乾並塗抹凡士林保濕，且指甲不要剪得太深，避免指甲邊緣紅腫發炎甚至化膿。
4. 服藥期間請定期回診監測肝功能。
5. 治療期間避免懷孕，也不要進行哺乳。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- \*若病人出現嚴重的大水皰性、水泡性與脫皮性皮膚狀況，應即暫停或停止服藥並就醫。
- \*急性過敏反應：呼吸困難、蕁麻疹、呼吸急促、意識混亂、嚴重皮膚不良反應。
- \*肝功能變化：深色尿、灰白色糞便、皮膚或眼白泛黃等。
- \*腎損傷/水腫：尿液顏色變化，尿量減少或腿和腳部腫脹。
- \*眼睛發炎：流淚、視力模糊、眼睛痛、及/或眼睛發紅。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/04/14】

BTC00ED24-02

**Afatinib** 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Afatinib	Giotrif®	妥復克膜衣錠	40 毫克/錠

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

\*腹瀉、嘔吐。光敏感。甲溝炎。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/04/14】

BTC00ED24-02