

Abrocitinib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Abrocitinib	Cibinqo®	喜績果膜衣錠	200 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

治療患有中度至重度異位性皮膚炎。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師處方與指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 錠劑應以水整粒吞服，不得切割、壓碎或嚼碎。
3. 可搭配或不搭配食物服用，
4. 如病人會感到噁心(副作用)，**搭配食物服藥可能會改善噁心感。**

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對活性成分或任何賦形劑過敏。
2. 如正處於嚴重的全身性感染，包括結核病。
3. 重度肝功能不全的病人不可使用。
4. 血栓形成風險可能增加的病人避免使用。
5. **懷孕與哺乳期間禁止使用。**(在治療期間及服用最後一劑後的1個月內使用有效的避孕方法)
6. 本藥品賦形劑含有乳糖，患有半乳糖不耐症、全乳糖酶缺乏症，或葡萄糖-半乳糖吸收不良等罕見遺傳問題的病人，不得使用。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時盡快服用;若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 請儲存於室溫 30°C 以下、避光、乾燥處。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 在治療期間或開始用藥前，**若需要接種疫苗，請務必先告知醫師**。特別是像水痘或麻疹這類『活病毒』疫苗，在服藥期間是不建議接種的，以免發生感染風險。**若還沒打過帶狀皰疹疫苗，強烈建議在開始服藥前先完成接種。**
2. 如果病人**出現嚴重感染、敗血症或伺機性感染，請考慮中斷服藥直到感染情形已受控制。**
3. 若**您目前正在服用保栓通(Plavix)、百無凝 (Brilinta)或其他抗凝血藥物，請務必在開始治療前告知醫師**。因在服用喜績果的前3個月，這些藥物的併用會顯著增加出血風險。但是，請勿為了服用本藥而自行停止原本的心血管藥物，這可能導致中風或心臟病發作。

->若服用本藥的風險過高，醫師可能會建議您改用其他安全性更高(不影響血小板)的生物製劑。

***特殊例外：低劑量阿斯匹靈 ($\leq 81\text{mg}$) 是目前唯一被允許在頭3個月可併用的防血栓藥物。**

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

*急性過敏反應:呼吸困難、蕁麻疹、呼吸急促、意識混亂、嚴重皮膚不良反應。

*栓塞:單側小腿突然腫脹、疼痛、發紅或突然呼吸困難、胸痛、劇烈咳嗽。請緊急就醫。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/04/14】

BTC00ED25-02

Abrocitinib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Abrocitinib	Cibinqo®	喜績果膜衣錠	200 毫克/錠

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

*噁心、尋常痤瘡、嘔吐、頭暈、頭痛等



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/04/14】

BTC00ED25-02