

### Acalabrutinib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Acalabrutinib	Calquence®	克瘤康膜衣錠	100 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

治療慢性淋巴球性白血病、淋巴瘤。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師處方與指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 用水整粒吞服，不可咀嚼、壓碎、溶解或分割錠劑。可以空腹或與食物併服。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 會對本藥過敏者。
2. 懷孕期間不可使用。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

如果錯過服用劑量超過 3 小時，則不必服用該次劑量，此後繼續按照原先排定的時間服藥即可。

\*注意不要加倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 請儲存於 30°C 以下室溫，避光、避濕、避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 同時接受抗血栓藥物治療者出血風險可能增加。因這款藥會讓血小板『變不黏』。如果您有併用抗凝血藥或魚油，請密切觀察是否有莫名黑青、牙齦出血、或傷口流不止的情況。
2. 服藥期間會影響血小板功能，增加出血風險。若近期有手術、拔牙、植牙或侵入性檢查的計畫，請務必先與主治醫師討論，評估是否需要提前停藥，以確保手術安全。
3. 此藥物克瘤康膜衣錠會微調免疫力，讓皮膚對陽光更敏感。出門請務必撐傘、遮陽或擦防曬，並留意身上是否有長期不癒合的傷口或形狀改變的黑痣。會微調免疫力，讓皮膚對陽光更敏感。出門請務必撐傘、遮陽或擦防曬，並留意身上是否有長期不癒合的傷口或形狀改變的黑痣。
4. 治療期間請勿服用長效型胃藥(如院內藥品：泰克胃通、保衛康治潰樂、得喜胃通)。這類藥物會抑制胃酸分泌，導致標靶藥物無法被身體吸收而失去療效。
5. 若因胃酸過多而感到不適，需服用一般胃片或胃乳(如院內藥品：艾胃逆服、雅露佳錠、氧化鎂)，請務必與標靶藥物間隔「至少 2 小時」，建議：先吃標靶藥，過 2 小時後再吃胃藥。
6. 禁止葡萄柚、文旦、大白柚和苦橙(苦橙常見於進口的果醬)：會讓藥物濃度過高，增加毒性。
7. 建議治療期間和接受最後一劑後 2 週內不要餵母乳。
8. 育齡女性於治療期間及停藥後至少 1 週內，應採取有效的避孕措施。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/04/14】

BTC00ED26-02

### Acalabrutinib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Acalabrutinib	Calquence®	克瘤康膜衣錠	100 毫克/錠

9. **男性**在治療期間以及服用最後一劑藥物後的至少 2 天內，與具生育能力的女性伴侶進行性行為時，應採取有效的避孕措施(如使用保險套)。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

\*急性過敏：呼吸困難、蕁麻疹、呼吸急促、意識混亂、嚴重皮膚不良反應。

\*心房顫動和心房撲動的症狀：如心悸、頭暈、暈厥、胸痛、呼吸困難。

\*血清肌酐升高：尿量突然減少、全身水腫、極度疲倦。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

\*腹瀉、貧血、頭痛、高血壓、流鼻血等。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/04/14】

BTC00ED26-02