

Brigatinib 口服製劑衛教單張

| 學名 | 商品名 | 中文名 | 含量/劑型 |
|------------|-----------|--------|---------|
| Brigatinib | Alunbrig® | 癌能畢膜衣錠 | 90 毫克/錠 |

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
治療肺癌。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師處方與指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 吞服整顆藥錠，請勿磨碎或咀嚼藥錠，可伴隨食物或空腹服用。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 已知會對本藥過敏者。
2. 本品含有單水乳糖，患有半乳糖不耐症、乳糖酶完全缺乏或葡萄糖-半乳糖吸收不良者不應使用。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

若漏服一劑或在服藥後嘔吐，請勿再服用額外劑量，且應在排定時間服用下個劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 請儲存於 30°C 以下室溫、避光、乾燥處。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服藥期間請配合定期回診，以監測心跳、血壓、血糖及肝功能的變化。
2. 因為身體需要適應藥物，頭一週會先吃低劑量(90mg)。這幾天如果覺得呼吸變得比平常喘、有胸悶感，請一定要告知醫護。
3. 在戶外時，得戴帽子並使用防曬乳和護唇膏以防止潛在的曬傷。在停用癌能畢膜衣錠後，得持續防曬至少 5 天。
4. 治療期間和服用最後一劑後 1 週內不應哺乳。
5. 具生育力的女性應於治療期間與服用最後一劑後至少 4 個月內使用有效的避孕措施。
6. 男性患者如有具生育力的女伴，男性患者應於治療期間與服用最後一劑後至少 3 個月內使用有效的避孕措施。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- *急性過敏：呼吸困難、蕁麻疹、呼吸急促、意識混亂、嚴重皮膚不良反應。
- *急性肺損傷：突然發作或加重的呼吸急促、持續乾咳、胸痛、發燒。
- *新視力症狀：突然視力模糊、複視(看東西有重疊)、對光敏感或看到閃光。
- *肝功能變化：如深色尿、灰白色糞便、皮膚或眼白泛黃等。
- *心血管異常：嚴重高血壓或心跳過緩。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

- *腹瀉、噁心、消化不良、口腔炎，血糖控制不佳。貧血、失眠、頭痛。
- *任何不明原因的肌肉痛、觸痛或無力。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/04/14】

BTC00ED27-02