

Baricitinib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Baricitinib	Olumiant	愛滅炎膜衣錠	4 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 類風濕性關節炎、幼年型特發性關節炎、異位性皮膚炎、圓禿。
2. COVID-19(需供氧、非侵入性/侵入性呼吸器或葉克膜)，為降低免疫系統的細胞激素風暴。

◆ **用量與用法：**

1. 不可剝半，應整顆服用。隨餐或空腹，可於當日任何時間服用。
2. 無法吞嚥整顆錠劑的病人，可直接整顆溶散或壓碎溶散後立刻投藥，可管灌。

***可能需要 10 分鐘才能溶散成淺粉色的混濁懸浮液。可能會有沉澱。**

3. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 過敏。
2. 懷孕。
3. 如果病人發生帶狀疱疹，應中斷治療，直到症狀解除。
4. 有活動性肺結核(TB)的病人不應使用愛滅炎膜衣錠。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
2. (如投餵淺粉色混濁懸浮液)如因任何原因未投予整份懸浮液，請勿額外溶散且服用另一顆錠劑，而應等到下一次排定劑量。

***錠劑溶散於水後，於室溫的安定性可達最高 4 小時。**

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 30°C 以下保存，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服藥期間如要接種活性減毒疫苗，如麻疹、腮腺炎、水痘疫苗、口服輪狀病毒疫苗...等，請先請醫生評估。通常在療程開始前，先依指南完成所有常規疫苗接種，而服藥期間禁止接種『活性減毒疫苗』。
2. 因為這個藥物會調節免疫力，可能會影響手術後的傷口癒合並增加感染風險。如果有計畫進行任何手術(包括拔牙或切除腫瘤)，請務必主動告知醫師。醫師會根據手術的大小，評估是否需要在手術前 1 週暫時停藥，等傷口長好後再恢復使用。
3. 在治療期間和治療後至少 1 週內，具有生育能力的女性必須使用有效的避孕措施。
4. 目前無法排除本藥物對新生兒的潛在風險，**哺乳期婦女不得使用**。若必須進行治療，請與醫師討論更換餵哺方式或調整用藥時機。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

***過敏反應：**全身出現嚴重的紅疹、蕁麻疹，或伴隨嚴重的搔癢。發現嘴唇、舌頭、眼皮或喉



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/4/14 修訂】

BTC00ED28-02

Baricitinib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Baricitinib	Olumiant	愛滅炎膜衣錠	4 毫克/錠

嚨有明顯的腫脹感。覺得胸口悶、呼吸不順、喘不過氣，或聲音突然變得沙啞。

*本藥會調節免疫，可能增加帶狀疱疹(皮蛇)的風險，若皮膚出現紅疹或神經痛就回診。

*肝指數升高: 持續發燒、不明原因疲倦、眼白或皮膚發黃、或是劇烈腹痛。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

*尋常痤瘡、高血脂、頭痛。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/4/14 修訂】

BTC00ED28-02