

## Dasatinib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Dasatinib	Sprycel®	柏萊膜衣錠	50 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 癌症用藥，白血病。

◆ **用量與用法：**

1. 藥錠不可磨碎、切割或咀嚼，必須整粒吞服。可伴隨或不伴隨食物服用，於早晨或晚上服用均可。

2. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

✚ 在下述特殊情況下(如癲癇或感染)，請務必依照醫囑更改服用柏萊(Sprycel)的頻率與劑量。「先處理緊急病況、再維持長期療效」是目前的治療首要原則，待病情穩定後，醫師會再指引您恢復原定劑量。

a. 柏萊(Sprycel)的藥性很容易被部分癲癇藥物抵消，導致肝臟過快將藥物排出而失去療效。若醫師為了補足藥效而調高劑量，請務必密切留意是否出現『呼吸變喘、胸口悶痛』或『皮膚莫名瘀青』，這代表柏萊的藥量可能過重並引發副作用，請立即回診。

b. 若必須併用強效藥物(如抗黴菌藥 Ketoconazole、抗生素 Erythromycin)，醫師會將您的柏萊(Sprycel)大幅減量(例如每天只吃平時的 1/3)。這是因為這些藥物會讓柏萊的藥性在體內暴增數倍，減量是為了維持治療平衡並避免嚴重毒性。請務必精準遵照醫囑，切勿因藥量變少而自行加回原劑量。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 過敏。

2. 懷孕。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 30°C 以下，避光、避濕、避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服用柏萊(Sprycel)期間應嚴禁食用葡萄柚、苦橙或柚子(大白柚、文旦、紅柚)、楊桃。這類食物會鎖住肝臟代謝功能，讓藥物在體內藥性暴增 5 倍以上。

2. 服用柏萊期間嚴禁使用聖約翰草，否則肝臟會像啟動加速器一樣把藥物排光，讓癌症治療失效。

3. 治療期間請勿服用長效型胃藥(如院內藥品：泰克胃通、保衛康治潰樂、得喜胃通)或 H2 拮抗劑(如藥品：胃樂順膜衣錠)。這類藥物會抑制胃酸分泌，導致標靶藥物無法被身體吸收而失去療效。

4. 若因胃酸過多而感到不適，需服用一般胃片或胃乳(如院內藥品：艾胃逆服、雅露佳錠、氧化鎂)，請務必與標靶藥物間隔「至少 2 小時」，建議：**先吃標靶藥，過 2 小時後再吃胃藥。**



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師  
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/04/14 修訂】

BTC00ED29-02

### Dasatinib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Dasatinib	Sprycel®	柏萊膜衣錠	50 毫克/錠

- 服用柏萊期間會影響血小板的凝血功能或心肺功能。若有計畫進行任何手術、拔牙或其他侵入性檢查，請務必提前告知醫師。停藥天數須由醫師根據您的手術性質來決定。
- 育齡女性在服用本藥期間及最後 1 劑後 30 天內應避孕。治療期間和最後 1 劑後的 2 週內，不建議哺乳。
- 男性患者在治療期間及最後一次給藥後的 7 天內，若與具生育能力的女性發生行為，請務必全程使用保險套，以避免藥物成分對精子或胎兒造成潛在影響。

#### ◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

##### 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫：

- \*過敏反應：全身出現嚴重的紅疹、蕁麻疹，或伴隨嚴重的搔癢。發現嘴唇、舌頭、眼皮或喉嚨有明顯的腫脹感。覺得胸口悶、呼吸不順、喘不過氣，或聲音突然變得沙啞。
- \*肋膜積水：走路、爬樓梯比以前更容易喘；變換姿勢時，咳嗽會加劇；當深呼吸或咳嗽時，胸口的一側(或兩側)會有明顯的刺痛感。
- \*體液滯留：呼吸困難、乾咳、胸痛或體重突然增加、下肢水腫。
- \*貧血、血小板減少或白血球減少：不明原因出血、瘀青或發燒感冒症狀。

##### 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫生：

- \*腹瀉、皮疹、疲倦、噁心、搔癢、疼痛、便秘。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師  
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/04/14 修訂】

BTC00ED29-02