

Darolutamide 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Darolutamide	Nubeqa	諾博戈膜衣錠	300 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 前列腺癌。

◆ **用量與用法：**

1. 建議與食物併服並吞服整顆藥錠。*因為隨餐服用能顯著增加藥物的吸收率。

2. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 過敏。

2. 本品含有乳糖。患有半乳糖不耐受症、總乳糖酶缺乏症或葡萄糖-半乳糖吸收不良的罕見遺傳病的病人不應服用本品。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 30°C 以下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 若發現「眼白或皮膚發黃、尿液顏色深如濃茶或是極度疲倦」，請立即回診，這可能是肝臟受損的徵兆。萬一確定發生肝功能異常，醫師會要求您暫停服用。請您放心，根據臨床經驗，只要能及時發現並停藥，受損的肝功能大多會逐漸恢復正常。

2. 不建議併用強效或中效 CYP3A4 誘導劑和 P-gp 誘導劑(癲癇藥物: 卡賓錠、苯巴比特魯錠、癲能停或抗結核藥: 立泛黴素或利肺膠囊; 保健品: 聖約翰草)。

3. 如本身有在服用降血脂藥 statin 類: 冠脂妥或立普妥的話，請密切觀察有無 statin 類相關副作用: 肌肉無力或痠痛或者是尿液顏色變得很深(像濃茶一樣)，因這款抗癌藥諾博戈會干擾排除 statin 類的藥，導致 statin 類在血液裡堆積，所以須告知醫生，以確保用量安全。

4. 可能會造成胎兒傷害和流產，建議在治療期間以及最後一次服用後 1 週內使用高效避孕措施。治療期間不要哺乳。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，應立即就醫

*過敏反應：全身出現嚴重的紅疹、蕁麻疹，或伴隨嚴重的搔癢。發現嘴唇、舌頭、眼皮或喉嚨有明顯的腫脹感。覺得胸口悶、呼吸不順、喘不過氣，或聲音突然變得沙啞。

*缺血性心臟病：運動時胸悶、胸痛或是突然變得很容易喘。

*特異性藥物性肝損傷[對肝臟的影響因人而異]：食慾不振、持續性噁心、嘔吐、右上腹不適；茶色尿、眼白和全身皮膚變黃、灰白色便...等。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

*疲勞、四肢疼痛、紅疹。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/04/14 修訂】

BTC00ED30-02