

Dacomitinib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Dacomitinib	Vizimpro	肺欣妥膜衣錠	30 毫克/錠
			45 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
 1. 肺癌。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 藥錠應整顆吞服，不可壓碎、切半或嚼碎，可伴隨食物或空腹使用。
 2. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 過敏。
 2. 若確診出間質性肺病則停用。
 3. 本品含有乳糖，患有半乳糖不耐症、全乳糖酶缺乏症等罕見遺傳者，則不得使用。
 4. 不應在懷孕時使用。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
 1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
 2. 若嘔吐或漏服一劑則不應服用額外劑量，應在隔天的常態服藥時間服用下一個處方劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：室溫 30°C 以下，避光、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 對於駕駛及操作機械能力會造成些微影響，請注意安全。
 2. 建議開始服藥時即加強皮膚保濕，減少日曬(用防曬乳、穿長袖)，若出現紅腫流膿應立即就醫，不可自行擠壓。在出現皮疹時，以局部抗生素、潤膚劑和局部類固醇治療。
 3. 應在首次出現腹瀉徵兆時，給予足夠的水分併用抗腹瀉藥品(如 Loperamide)，直到稀軟便消失 12 小時為止。
 4. 為避免甲溝炎，平時即加強指緣保濕(如塗抹凡士林)，修剪指甲時避免過深，若指甲邊緣出現紅腫、刺痛或流膿應立即就醫，不可自行擠壓。
 5. 為避免口腔黏膜炎，開始服藥時即改用軟毛牙刷，並避開辛辣、過燙或酸性食物，若口腔內出現紅腫或潰瘍應立即就醫，不可強行刷洗傷口。
 6. 治療期間請勿服用長效型胃藥(如院內藥品：泰克胃通、保衛康治潰樂、得喜胃通)。這類藥物會抑制胃酸分泌，導致標靶藥物無法被身體吸收而失去療效。
 7. 若因胃酸過多而感到不適，需服用一般胃片或胃乳(如院內藥品：艾胃逆服、雅露佳錠、氧化鎂)，請務必與標靶藥物間隔「至少 2 小時」，建議：**先吃標靶藥，過 2 小時後再吃胃藥。**
- *當胃部不夠酸時，肺欣妥會無法充分溶解，導致血液中的藥物濃度大幅下降。
- 8. 應避免併用主要經由 CYP2D6 代謝的藥品，像是含有止咳成分的 dextromethorphan(如院內品項：福得可錠、愛舒可羅膜衣錠、樂減咳複方膠囊)。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
 思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/04/14 修訂】

BTC00ED31-02

Dacomitinib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Dacomitinib	Vizimpro	肺欣妥膜衣錠	30 毫克/錠
			45 毫克/錠

*因肺欣妥抑制了 **CYP2D6** 該酵素，導致止咳藥無法發揮應有的效果，反而讓藥物原成分在體內堆積，可能引發嚴重的嗜睡、頭暈甚至幻覺。

9. 有生育能力女性應在療法過程及完成療法後至少 17 天(5 個半衰期)的期間使用適當的**避孕**方式。接受本品治療時**不要哺乳**。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- *嚴重過敏：全身出現嚴重的紅疹、蕁麻疹，或伴隨嚴重的搔癢。發現嘴唇、舌頭、眼皮或喉嚨有明顯的腫脹感。覺得胸口悶、呼吸不順、喘不過氣，或聲音突然變得沙啞。
- *間質性肺病：如發生急性或無法解釋之肺部症狀惡化者請醫生先評估是否是間質性肺病。
- *嚴重腹瀉：若發生腹瀉，應多補充電解質與水分，並遵醫囑使用止瀉藥(如 Loperamide)。若腹瀉超過 24 小時未改善應回診。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

- *皮疹、甲溝炎、口腔炎、貧血。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/04/14 修訂】

BTC00ED31-02