

Entrectinib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Entrectinib	Rozlytrek	羅思克膠囊	200 毫克/顆

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 非小細胞肺癌、NTRK 基因融合陽性之實體腫瘤。

◆ **用量與用法：**

1. 膠囊應整顆吞服，不可打開、壓碎、咀嚼或溶解內容物。可與食物併服或空腹服用。

2. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

✚ **針對吞嚥困難患者：懸浮液製備法**

*在製備口服懸浮液時，請勿觸摸您的眼睛、鼻子或嘴巴。

*因個體差異，在您第一次泡製藥水前，請務必與醫師或藥師確認：加入水(或牛奶)的體積，以及每次灌食(或服用)時應抽取的懸浮液量。

✧ **假如病人甲每日口服 600 毫克 1 回**

- 準備藥量：取出 3 顆 200 毫克膠囊(總劑量 600 毫克)。
- 混合藥粉：小心打開膠囊，將粉末倒入裝有 30 mL 飲用水或牛奶的杯中。
- 充分分散：攪拌或搖晃後，靜置 15 分鐘。
- 立即服用：混合完成後應立即服用。若無法立即服用，請依照醫師指示在規定時間內完成。在服用口服懸浮液後喝水，以確保完全吞服。
- 若未在 2 小時內使用，請丟棄任何未使用的懸浮液(30°C 以下)。

✧ **假如病人乙每日管灌 600 毫克 1 回 (已製備好 30mL 懸浮液)**

- 灌入 10 mL 藥水 ->接著灌 10 mL 清水 (沖洗管壁)。
- 再灌 10 mL 藥水 ->接著灌 10 mL 清水。
- 灌完最後 10 mL 藥水 -> 接著灌 10 mL 清水。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

- 過敏。
- 懷孕。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若已接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

- 儲存環境：室溫 30°C 以下，避光、避濕及避熱。
- 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

- 治療第 1 個月期間，應每 2 週 1 次監測肝功能(包括 ALT 及 AST)，之後為每個月 1 次或視臨床需要而定。
- 如發生視覺異常可能會增加跌倒或發生意外(如開車)的風險，得注意自身安全並定期回診。
- 本藥會增加骨折風險，尤其是兒童或老年病患。若發生不明原因的骨骼疼痛應提高警覺。
- 部分患者會出現味覺改變(如金屬味或味覺變淡)。建議使用無酒精且溫和的漱口水保持口腔



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/04/15 修訂】

BTC00ED34-02

Entrectinib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Entrectinib	Rozlytrek	羅思克膠囊	200 毫克/顆

清潔，並嘗試常溫食物以減少感官刺激。此現象通常在停藥後會逐漸恢復，不需過度擔心。

- 服用羅斯克膠囊期間，應完全避免食用葡萄柚、柚子(包含文旦)、楊桃及苦橙(苦橙常用於進口柑橘果醬)。這些食物會抑制藥物代謝，導致藥物在體內濃度過高，進而增加產生嚴重副作用的風險。
 - 具生育能力的**女性**，在治療期間及服用最後 1 劑後的 5 週內，應採取有效的**避孕**方式。
 - 男性**病人在治療期間及服用最後 1 劑後的 3 個月內，應採取有效的避孕措施。
 - 治療期間及最後一次給藥後 7 天內應**停止哺乳**。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫：

- *過敏反應：全身出現嚴重的紅疹、蕁麻疹，或伴隨嚴重的搔癢。發現嘴唇、舌頭、眼皮或喉嚨有明顯的腫脹感。覺得胸口悶、呼吸不順、喘不過氣，或聲音突然變得沙啞。
- *充血性心衰竭：突然出現呼吸困難、靜止時也喘且下肢明顯水腫、體重在 1-2 天內快速增加。
- *QT 間期延長：感到心悸、劇烈頭暈、暈厥(昏倒)。
- *影響大腦：嚴重的意識模糊、幻覺、失語(無法正常說話)、極度情緒波動、嚴重的平衡失調導致無法行走。
- *若出現視力模糊或閃光感，應立即回診諮詢眼科。
- *嚴重骨折(非創傷性)：沒有明顯跌倒，出現劇烈的骨骼或關節疼痛、局部紅腫或無法負重。
- *肝臟損傷：眼白或皮膚變黃(黃疸)、尿液顏色深如濃茶。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫生：

- *高尿酸、貧血、肝指數升高、血清肌酐升高。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/04/15 修訂】

BTC00ED34-02