

## Hydroxyurea 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Hydroxyurea	Hydrea	愛治膠囊	500 毫克/膠囊

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 黑色素瘤、卵巢癌、慢性骨髓性白血病等。

◆ **用量與用法：**

1. **服藥後請飲用大量開水**並按時服藥

2. 若吞嚥困難，膠囊內容物可倒入水中立即服用，但須**小心粉末不可吸入或接觸皮膚**。

3. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 過敏。

2. **懷孕**。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 可能出現皮膚色素沉著或指甲顏色變深。注意**防曬**。

2. 這個藥會干擾您的「連續血糖監測器 (CGM)」，讓機器測出來的血糖值虛高、不準確。

如果平時有在服用降血糖藥或施打胰島素，**千萬不要根據 CGM 的數值自行加藥，否則會引發危險的低血糖。這段時間請改回用「扎手指」採血，並將數值記錄在手冊中。**

3. 建議每日**飲用充足水分(約 2000c.c.)**，以助於尿酸排泄，預防痛風發作。

4. 處理藥物時請戴拋棄式手套，且前後均須洗手；非使用者請勿接觸藥物。小心膠囊粉劑洩漏，嚴禁吸入或接觸皮膚黏膜。若粉劑灑出，請用濕抹布拭淨並密封於塑膠袋內丟棄，不可直接清掃。

5. 建議有生育能力的**女性**，治療期間和治療後至少 6 個月，應避免**懷孕**。

6. 建議接受治療的**男性**在治療期間及治療後至少 1 年內使用安全的避孕方法。

7. 由於藥物成分會經由乳汁分泌，建議**停止授乳**，以確保母嬰健康。

8. 服藥期間免疫力較低，請勿接種『活性減毒疫苗』，施打任何疫苗前均須先諮詢醫師。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. **如發生以下症狀時，請立即就醫**

\*嚴重過敏警訊：呼吸困難、呼吸困難、唇舌腫脹、劇烈胸痛或全身紅疹。

\*異常出血：牙齦出血不止、皮膚無故出現紫斑或小紅點。

\*皮膚異狀：皮膚出現紫黑色斑點，或腳踝處有難以癒合的疼痛潰瘍。

\*肺部毒性：出現持續乾咳、不明原因的呼吸急促。

2. **如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師**



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/04/15 修訂】

BTC00ED35-02

**Hydroxyurea** 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Hydroxyurea	Hydrea	愛治膠囊	500 毫克/膠囊

- \*皮膚或指甲顏色變深(色素沉著)、掉髮、皮膚乾燥。
- \*噁心嘔吐、食慾不振或嚴重腹瀉、口腔潰瘍或吞嚥疼痛。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師  
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/04/15 修訂】

BTC00ED35-02