

Letrozole 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Letrozole	Femara	復乳納膜衣錠	2.5 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 停經後乳癌。

◆ **用量與用法：**

1. 通常是每日 1 次，1 次 1 錠。可與食物併服或單獨投予，食物並不會影響藥物的吸收。

2. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對所含成份過敏。

2. 停經前(內分泌仍有作用之狀態)。

3. 懷孕、哺乳。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 30°C 以下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 可能引起疲勞、頭暈或嗜睡。服藥期間若需開車、操作機械或進行高風險工作，請務必提高警覺，確認無影響後再進行。

2. 雌激素極低會導致骨質流失。建議定期接受骨密度檢測。

3. 部分病患會感到關節僵硬或痠痛，通常在早起時最為明顯。可經醫師指示服用止痛藥，並維持適度運動。

3. 若有熱潮紅、盜汗，可採取洋蔥式穿法，避免辛辣食物與酒精，保持環境通風。

4. 此藥可能導致膽固醇升高。服藥期間應定期追蹤血脂數值，並保持低油、低糖的健康飲食習慣。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫：

*嚴重過敏反應：呼吸困難、喉嚨緊縮、臉部/唇舌腫脹、劇烈胸痛、全身紅疹或暈眩。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫生：

*高膽固醇血症、便秘、肌痛、熱潮紅、多汗等



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/04/15 修訂】

BTC00ED36-02