

## Lapatinib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Lapatinib	Tykerb	泰嘉錠	250 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 乳癌。

◆ **用量與用法：**

1. 空腹，**進食前或後間隔 1 小時以上服用。**

2. 藥錠應整顆吞服，不可壓碎或嚼碎。

3. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 過敏。

2. 如有間質性肺疾病及肺炎。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 30°C 以下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 如有**手足症候群**(**手腳掌發紅、脫皮或疼痛**)，建議加強手腳保濕，穿著寬鬆鞋襪，避免接觸過熱的水。洗手或洗澡水溫建議維持在 25-30°C 左右，避免擴張血管加重紅腫。另外，皮膚對光較敏感，出門請**做好防曬**。若手腳掌出現刺痛感、發麻、起水泡或影響到拿東西、走路，請主動告知醫師，可能需要調整藥物劑量。

2. 建議在用藥前、用藥後的每 4-6 週定期**追蹤肝功能**。

3. 藥物可能影響心臟功能(降低左心室射出率)，若**出現呼吸困難、心悸或下肢水腫，應立即回診**。

4. **腹瀉**多發生在服藥的第一週。請確保手邊備有醫師開立的止瀉藥(如 Loperamide)，一旦出現稀軟便即可依醫囑服用並補充電解質。若每日次數增加超過 4 次或伴隨發燒請即刻就醫。

5. **避免使用長效制酸劑**(例如本院的泰克胃通口溶錠、保衛康治潰樂)，可改用短效制酸劑並間隔服用。如果有胃食道逆流或胃痛困擾，請務必先告知醫師。

6. 服用泰嘉錠期間(包含停藥後 3 天內)應**不要食用葡萄柚**，因為這會抑制藥物代謝，導致體內藥物濃度過高。

7. 使用此藥期間至停藥至少 5 天內**避孕**使用有效**避孕法**且**不要哺乳**。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. **如發生以下症狀時，請立即就醫：**

\*嚴重過敏反應：全身出現嚴重的紅疹、蕁麻疹，或伴隨嚴重的搔癢。發現嘴唇、舌頭、眼皮或喉嚨有明顯的腫脹感。覺得胸口悶、呼吸不順、喘不過氣，或聲音突然變得沙啞。

\*嚴重肝毒性：出現眼白發黃、尿液呈深褐色或嚴重的右上腹痛。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師  
思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/04/15 修訂】

BTC00ED37-02

**Lapatinib** 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Lapatinib	Tykerb	泰嘉錠	250 毫克/錠

\*心臟不適：若出現呼吸困難、不正常心悸或下肢水腫，請立即回診。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫生：

\*厭食、腹瀉、噁心、嘔吐、皮疹、疲倦、失眠。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師  
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/04/15 修訂】

BTC00ED37-02