

## Lenvatinib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Lenvatinib	Lenvima	樂衛瑪膠囊	4 毫克/顆
			10 毫克/顆

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 癌症用藥。

◆ **用量與用法：**

1. 每日口服一次，可隨餐或空腹使用，須於每日同一時間服用。

2. 無法吞服膠囊(不需打開或壓碎)可將其靜置於水或蘋果汁中至少 10 分鐘，再攪拌至少 3 分鐘溶解後飲用，飲用混合液後，再加入一大湯匙的水或蘋果汁於玻璃杯中，攪勻後再飲用完。

3. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 過敏。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 30°C 以下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 建議監測血壓：每日早晚固定量血壓，如果伴隨嚴重頭痛、視力模糊，請務必回診調整血壓藥。

2. 治療前應監測蛋白尿、甲狀腺功能，並於治療期間定期監測蛋白尿、血鈣。

3. 若發生手足皮膚反應(手腳掌紅腫疼痛)，可擦含尿素(Urea)的保濕乳液，穿著舒適棉襪，避免長時間走動摩擦、慢跑或提重物。可每日多次塗抹高度滋潤的凡士林或乳霜，且洗完澡後立即塗抹並穿上棉襪鎖水。避免泡溫泉、桑拿，或用過熱的水洗手腳(水溫應低於 30°C)。

4. 此藥會影響傷口癒合，通常需要術前至少 1 週停藥，術後需經醫師確認傷口癒合良好再恢復用藥。

5. 服藥期間應避免拔牙、植牙等侵入性牙科手術。若有看牙需求，請務必主動告知牙醫師您正在服用標靶藥物樂衛瑪膠囊(Lenvatinib)。

6. 治療期間及服用最後一個劑量後至少 30 天應採取有效之避孕措施。

7. 治療期間及服用最後一個劑量後至少 1 周需停止哺乳。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時請立即就醫


\*嚴重過敏反應：全身出現嚴重的紅疹、蕁麻疹，或伴隨嚴重的搔癢。發現嘴唇、舌頭、眼皮或喉嚨有明顯的腫脹感。覺得胸口悶、呼吸不順、喘不過氣，或聲音突然變得沙啞。

\*腸胃不適：若出現持續且劇烈的腹痛、頻繁嘔吐、或糞便顏色變深、帶血。

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/04/20 修訂】

BTC00ED38-02



仿單查詢

### Lenvatinib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Lenvatinib	Lenvima	樂衛瑪膠囊	4 毫克/顆
			10 毫克/顆


- \*血管栓塞：突然單側肢體無力、說話不清、嘴角歪斜、或突發性胸痛。
  - \*高血壓：若血壓持續飆高(如收縮壓超過 160 mmHg)合併嚴重後腦勺頭痛、視力模糊，請務必回診。
  - \*異常出血：如頻繁流鼻血、咳血、牙齦大量出血或尿液帶血。
  - \*顎骨壞死：若發現牙齦傷口久而不癒、牙齒鬆動、或齒槽骨暴露，請立即告知醫師並避免拔牙等侵入性牙科手術。
2. 如以下症狀嚴重且持續時請告知醫生
- \*關節痛、肌痛。持續疲倦、食慾不振、體重明顯減輕。口腔潰瘍。



本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/04/20 修訂】

BTC00ED38-02



仿單查詢