

## Lenalidomide 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Lenalidomide	Revlimid®	瑞復美膠囊	5 毫克/膠囊

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

治療多發性骨髓瘤、骨髓增生不良症候群、濾泡性淋巴瘤。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師處方與指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 應於每天的固定時間服用，可單獨服用或與食物併服。
3. 膠囊應整粒以水送服，不應打開、打破或咀嚼。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 已知會對本藥過敏者。
2. **懷孕**。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 請儲存於 25°C 以下室溫、避光、乾燥處。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服藥期間請定期回診 **監測肝功能**。
2. 建議定期 **監測視力**。
3. 密切觀察 **是否發生血栓症狀**。
4. 在開始接受治療的 4 週前、用藥期間、用藥暫停期間、徹底停藥後 4 週內，應 **避免懷孕(無論男性或女性)**。
5. 治療期間 **不要餵哺母乳**。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- \*過敏：若服藥後皮膚出現紅疹、發癢或局部腫脹，呼吸困難、胸悶或臉部嘴唇極度腫脹。
- \*血栓：若出現單側下肢腫痛、突發性胸痛或呼吸困難，請立即就醫。
- \*視覺器官惡化：新視力症狀(如視力模糊、複視)或原有症狀惡化。
- \*肝毒性：如深色尿、灰白色糞便、皮膚或眼白泛黃等。
- \*血液毒性：嗜中性白血球低下症(增加感染風險：如發燒、發冷、喉嚨痛)、血小板減少(增加瘀青或出血風險)、貧血(易感到疲倦、體力大不如前)。
- \*史蒂文生-強生症候群(Stevens-Johnson Syndrome, SJS)：若出現不明原因發燒、喉嚨痛伴隨全身紅疹或水泡，應立即停藥並就醫。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

- \*腹瀉或便秘、水腫、肌痛。皮疹、搔癢。
- \*甲狀腺異常：異常怕冷/怕熱、體重莫名改變、心悸。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/04/20】

BTC00ED39-02