

Mycophenolate 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Mycophenolate	Myfortic®	睦體康腸衣錠	180 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
預防移植之排斥、治療狼瘡性腎炎。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 請遵循醫師處方與指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
 2. 與或不與食物一同服用皆可。
*請固定服藥方式(固定空腹或固定隨餐服藥)，不要隨意切換，以保持體內藥物濃度穩定。
 3. 錠劑不可磨碎服用，應整顆吞服。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 已知會對本藥過敏者。
 2. **懷孕及哺乳。**
 3. 若有罕見遺傳性代謝疾病: Lesch-Nyhan、Kelley-Seegmiller。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 請儲存於 30°C 以下室溫、避光、乾燥處。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 關於**胃藥併用**：
 - a) 強效胃藥 (質子幫浦抑制劑 PPI)：睦體康較不受常見強效胃藥(如院內藥品：泰克胃通、保衛康、得喜胃通)影響，可依照醫師處方安心服用。
 - b) 一般胃散/胃乳片：若服用含鋁、鎂成分的胃藥，需與本藥間隔 2 小時，以免影響睦體康的吸收導致藥效降低。
 2. 服藥期間請**注意防曬**，若要在陽光下活動，可以藉由帽子、衣服覆蓋及塗抹高係數的防曬乳來避免過多曝曬。
 3. 服藥期間免疫力會降低，**請避免食用生食**(如生魚片、生蛋、未煮熟肉類)，並盡量避開人潮擁擠的公共場所或與感冒患者接觸。
 4. 請做好牙齒及牙齦的**衛生管理**，避免口腔感染。
 5. 如**需接種疫苗請先與醫生討論**，因接種疫苗可能無法發揮原本該有的效果，而且須避免使用活的減毒疫苗。
 6. 錠劑內含有乳糖，如果有乳糖不耐，請先告知醫生。
 7. 有生育能力的**女性**在開始治療之前、治療期間和最後一次投予後六週內，應使用有效的**避孕**措施。
 8. 有生育能力的**男性**在用藥至停藥後 13 週內須嚴格避孕及禁止捐精，伴侶亦須配合避孕。
 9. 治療期間和停止治療後 6 週內應**停止哺乳**。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/04/22】

BTC00ED40-02

Mycophenolate 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Mycophenolate	Myfortic®	睦體康腸衣錠	180 毫克/錠

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- *急性過敏：呼吸困難、蕁麻疹、呼吸急促、意識混亂
- *嚴重皮膚不良反應：全身出現不明原因的水泡、紅疹或黏膜(如口腔、眼睛)潰爛。
- *感染跡象：發燒($>38^{\circ}\text{C}$)、發冷、嚴重喉嚨痛。
- *異常出血：意外的皮膚青紫色挫傷(瘀青)、出血不止、或是牙齦/鼻孔出血。
- *壓陷性水腫：手、腳踝或腳部有明顯的腫脹感(壓下去凹陷不易回彈)。
- *神經系統異常：記憶力突然喪失、說話變得困難或含糊、理解能力變差。身體協調性改變、動作變得遲鈍、四肢肌肉無力。視力模糊、複視(看東西有重影)或視力惡化。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

- * 高血壓、腹痛、腹脹、肌痛。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/04/22】

BTC00ED40-02