

Osimertinib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Osimertinib	Tagrisso	泰格莎膜衣錠	80 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療肺癌。

◆ **用量與用法：**

1. 藥錠應整顆吞服，不可壓碎或嚼碎。可空腹或與食物併用。

2. **無法吞服的病人**，可將錠劑於 60 毫升非碳酸水中，攪拌**直到錠劑崩散至小碎塊(錠劑本身不會完全溶解)**後立即喝下。再以 120-240 毫升水沖洗容器後立即喝下。

*製備期間不要壓碎、加熱或用超音波震碎。

3. 若需要由鼻胃管投藥，將錠劑崩散於 15 毫升非碳酸水中，另以 15 毫升的開水沖洗殘餘藥並移至灌食空針，將 30 毫升的藥品液體依鼻胃管使用說明進行給藥，再以適量的開水沖洗管道(約 30 毫升)。重複此步驟，直到灌食空針中沒有殘留碎片。崩散物和殘留物應在錠劑加入水中後 30 分鐘內服用。

4. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 過敏。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 可能出現**甲溝炎或皮膚乾燥**，指甲應修剪平整，避免剪太深或撕扯指甲旁的倒刺，選取寬鬆的鞋襪，避免腳趾受到過度摩擦或壓迫。另外，避免用過熱的洗澡水，建議在洗澡後皮膚微濕時立即塗抹保濕乳液。若出現**手足皮膚反應**(紅腫疼痛)，建議使用含有尿素(Urea)的保濕乳液。

2. 為避免**口腔黏膜炎**，可以每天早晚或飯後用溫鹽水(或無酒精漱口水)漱口，藉此保持口腔清潔，減少細菌感染。並適時喝水藉此保持口腔濕潤，畢竟口乾會加重黏膜損傷。另外，食物放涼點再吃，也不要吃過於刺激的食物。*溫鹽水: 250cc 溫開水 + 半茶匙鹽巴。

3. **結核藥(Rifampin)、聖約翰草、癲癇藥物**，會大幅降低本品的血中濃度，應避免併用。

4. 有生育可能性的**女性**於治療間至最後一次給藥後 6 週內採取有效**避孕**措施。

5. **男性**於治療期間至最後一次給藥後 4 個月內採取有效避孕措施。

6. 哺乳婦女於治療期間至最後一次給藥後後 2 週內應**停止哺乳**。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，應立即就醫

*過敏：若服藥後皮膚出現紅疹、發癢或局部腫脹，呼吸困難、胸悶或臉部嘴唇極度腫脹。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/04/22 修訂】

BTC00ED41-02

Osimertinib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Osimertinib	Tagrisso	泰格莎膜衣錠	80 毫克/錠

- *間質性肺病：突發性咳嗽、發燒或呼吸困難。
- *眼部問題：視力模糊、眼紅、疼痛或畏光。
- *心臟電生理異常 (QT 間期延長)：突然感到心跳過快、心悸(心臟怦怦跳得很亂)，或者伴隨嚴重的頭暈、甚至突然暈倒。
- *造血功能異常 (再生不良性貧血)：莫名出現全身大片瘀青、牙齦或鼻孔出血不止、臉色變得極度蒼白、或是持續性發燒感冒不癒。
- *嚴重的皮膚反應 (EM /SJS / TEN)：全身出現不明原因的紅色斑塊，且中心或周邊開始長出水泡。口腔內、眼睛(紅腫痛)、生殖器或尿道口出現潰瘍或皮膚剝落。進食刺痛、排尿困難、甚至眼睛睜不開。遇此情況立即停藥。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

- *皮疹、腹瀉、貧血等



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/04/22 修訂】

BTC00ED41-02