

Palbociclib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Palbociclib	Ibrance	愛乳適膠囊	100 毫克/錠
			125 毫克/錠

◆ **用途：**（一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡）

◆ 乳癌。

◆ **用量與用法：**

1. 應與**食物併服**，最好是於用餐時服用。
2. 請**整粒吞服**（吞服前請勿咀嚼、咬碎或打開膠囊），需管灌時用溫水溶解整粒膠囊。
3. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 過敏。
2. 本藥含有乳糖 (Lactose)。患有半乳糖不耐症、總乳糖酶缺乏症或葡萄糖-半乳糖吸收不良的罕見遺傳病友絕對不可使用。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 30°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 按醫師指示作抽血檢查，**定時抽血**。
2. 吃這款標靶藥會讓**口腔和腸道黏膜變薄**，比較容易破皮或長口瘡。最好換成生理食鹽水或不含酒精的漱口水並且避開刺激性(辣、酸)與高溫食物，才不會刺激傷口，讓黏膜能好好自我修復。
3. 服藥後可能感到極度疲倦，開車或操作機械時需格外謹慎。
4. **嚴禁併用葡萄柚、葡萄柚汁**。會導致藥物濃度飆高，引發嚴重的白血球低下。
5. 聖約翰草雖然是天然草本，但它會讓您的標靶藥失效，應**完全避免使用聖約翰草**。
6. 如有懷孕可能就請**避孕**。**女性**患者於治療期間及停藥後 3 週內須持續避孕。**男性**患者於治療期間及停藥後 14 週須持續避孕。

*若未來有生育計畫，強烈建議在開始治療前先進行「精子冷凍保存」。

7. 在服用最後一劑愛乳適之後，至少 3 週內仍應**避免哺乳**。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

*過敏：若服藥後皮膚出現紅疹、發癢或局部腫脹，呼吸困難、胸悶或臉部嘴唇極度腫脹。

*這類標靶藥物會導致白血球低下，若出現發燒(>38.5°C)、畏寒或喉嚨痛等症狀，應立即就醫，不可自行購買退燒藥(如普拿疼)，因其可能掩蓋發燒跡象。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫生



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/04/22 修訂】

BTC00ED42-02

Palbociclib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Palbociclib	Ibrance	愛乳適膠囊	100 毫克/錠
			125 毫克/錠

*食慾降低、口腔炎、噁心、嘔吐、腹瀉、皮疹、禿頭。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/04/22 修訂】

BTC00ED42-02