

## Abemaciclib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Abemaciclib	Verzenio®	捷癌寧膜衣錠	150 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 乳癌

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 可隨餐或空腹使用，不可將錠劑咀嚼、壓碎或切半後吞服。
3. 服藥期間**嚴禁食用葡萄柚或大白柚**。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對於 VERZENIO 內之有效成份或賦形劑過敏者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用;若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 請儲存於 30°C 以下室溫、避光、乾燥處。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 為了您的用藥安全，看診時請務必主動出示您目前正在服用的所有藥單(包含慢性病藥、抗黴菌藥、抗癲癇藥或抗生素)，由醫師評估是否需要調整標靶藥的劑量。切勿自行在藥局購買成藥或補充草本保健品。
2. **腹瀉**是此藥最典型的副作用，通常發生在服藥後的第 1 週。若出現稀便，請立即服用醫師預開的止瀉藥(如 Loperamide，像本院的依莫瀉膠囊)並補充水分與電解質(如運動飲料、清燉湯品)。若每日腹瀉超過 4-6 次且藥物無法控制，請立即回診就醫。  
\*暫停軟便劑：若平時有服用軟便藥或瀉藥，出現稀便時請先暫停使用。
3. 這款藥可能會讓您的抽血報告中『肌酸酐 (腎功能指數)』稍微上升，這通常不代表腎功能惡化，醫師會持續監測，請勿過度驚慌。
4. 服用此藥可能會讓部分病人感到輕微疲倦或頭暈。在尚未確定藥物是否會影響您的精神狀態前，**駕駛交通工具或操作精密機械時請務必格外小心**。
5. 嚴禁併用葡萄柚、文旦、白柚。會導致藥物濃度飆高，引發嚴重的白血球低下。
6. 聖約翰草雖然是天然草本，但它會讓您的標靶藥失效，應**完全避免使用聖約翰草**。
7. 本藥錠含有乳糖。若您患有乳糖不耐症、乳糖酶缺乏症或葡萄糖-乳糖吸收異常等遺傳性疾病，請務必主動告知醫師。
8. 治療期間至停藥後 3 週內，必須採取可靠的**避孕措施**，且**禁止哺餵母乳**。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師  
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2025/05/15 修訂】

BTC00ED47-02

Abemaciclib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Abemaciclib	Verzenio®	捷癌寧膜衣錠	150 毫克/錠

◆ 本藥可能引起哪些副作用?當發生時該如何處理?

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

\*過敏：全身出現嚴重的紅疹、蕁麻疹，或伴隨嚴重的搔癢。發現嘴唇、舌頭、眼皮或喉嚨有明顯的腫脹感。覺得胸口悶、呼吸不順、喘不過氣，或聲音突然變得沙啞。

\*間質性肺炎：出現持續性乾咳（沒痰）、莫名覺得喘、或胸口有壓迫感。

\*嗜中性球低下(感染警訊)：發燒(體溫超過 38°C)、畏寒發抖；喉嚨痛、口腔潰瘍(嘴破)；或任何疑似感染症狀：如尿尿疼痛、咳嗽有痰。

\*肝毒性：皮膚或眼白發黃(黃疸)、尿液顏色深如茶色或咖啡色、感到極度疲倦。

\*靜脈血栓(VTE)：單側下肢(小腿或大腿)突然腫脹、疼痛、發紅或發紫；或突然感到劇烈胸痛、呼吸急促。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

\*腹瀉、貧血、疲倦、噁心、嘔吐和食慾不振。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師  
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2025/05/15 修訂】

BTC00ED47-02