

Ribociclib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Ribociclib	Kisqali®	擊癌利膜衣錠	200 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療荷爾蒙受體陽性/**Her-2** 陰性，轉移性乳癌的病患。

◆ **用量與用法：**

1. 可隨餐或空腹服用，藥錠應整顆吞服，不可咀嚼、壓碎或剝開藥錠
2. 不可與葡萄柚或葡萄柚汁併服。
3. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 過敏。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用;若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
2. 如果在服藥後嘔吐或錯過一劑，當天不需補服另一劑，應根據正常服藥時間服用下一劑。

◆ **藥品儲存：**

1. 請儲存於 30°C 以下室溫、避光、乾燥處。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 剛開始吃藥的前兩個月，通常每兩週要抽一次血，請務必配合。
2. 不宜與 tamoxifen(如本院的諾瓦得士錠 Nolvadex)合併使用。如果正在吃這款『諾瓦得士(Nolvadex)』，記得告知醫生。
3. 如果需要服用以下類型的藥物，請務必先諮詢您的主治醫師：特定的抗生素或抗黴菌藥(如：口服治灰指甲或嚴重感染的藥)或特定的心律不整的藥物。
4. 服藥期間不可以吃葡萄柚、柚子、大白柚，這會干擾藥物代謝，增加副作用。
5. 有生育能力的女性，服藥期間到停藥後的 3 週內，請務必配合**避孕**措施。
6. 預備授乳的女性，服藥期間到停藥後的 3 週內，請**暫停親餵或擠奶餵食**。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

*過敏: 全身出現嚴重的紅疹、蕁麻疹，或伴隨嚴重的搔癢。發現嘴唇、舌頭、眼皮或喉嚨有明顯的腫脹感。覺得胸口悶、呼吸不順、喘不過氣，或聲音突然變得沙啞。

*呼吸困難: 出現嚴重的咳嗽、胸痛或喘不過氣。

*心跳異常: 感覺心跳過快、亂跳、頭暈或昏倒。

*白血球低下(易引發感染): 可能會發燒(體溫超過 38°C)、喉嚨紅腫疼痛，或嘴巴內出現破洞; 咳



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2025/05/15 修訂】

BTC00ED48-02

Ribociclib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Ribociclib	Kisqali®	擊癌利膜衣錠	200 毫克/錠

嗽、有痰；泌尿道感染；莫名感到很冷、發抖。

*黃疸：皮膚或眼白發黃、尿液變成深褐色。

*毒性表皮溶解症 TEN(罕見但極嚴重)：身上紅疹越來越多、開始長水泡或皮膚一碰就掉、嘴唇或嘴巴裡面開始爛掉、疼痛。請立即停藥並直接去急診！

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

*腸胃不適：噁心、嘔吐、腹瀉或便秘。

*貧血：紅血球減少，可能會容易喘或臉色蒼白。

*疲倦、虛弱。掉髮或頭髮變稀疏、皮膚紅疹、搔癢。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2025/05/15 修訂】

BTC00ED48-02