

## Encorafenib 製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Encorafenib	Braftovi <sup>®</sup>	迫癌癒膠囊	75 毫克/膠囊

◆ 用途：(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

黑色素瘤、結腸直腸癌與非小細胞肺癌。

◆ 用量與用法：

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 膠囊應配水**整顆吞服**，可搭配食物或不搭配食物服用。
3. 應避免與葡萄柚汁同時服用。

◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：

1. 過敏。
2. 孕婦或疑似懷孕之婦女。

◆ 忘記服藥時該如何處理？

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
2. 如果服藥後嘔吐，當天不要補吃，隔天時間到了吃正常劑量即可。

◆ 藥品儲存：

1. 儲存環境：室溫 30°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ 注意事項：

1. 這款藥可能影響視力。若覺得看東西變模糊、變暗、變得很怕光，或眼睛紅痛、黑影飛蚊突然變多，請立即回診檢查。**若出現視覺障礙，請避免駕駛或操作機械。**
2. 皮膚會對紫外線極度敏感。**出門必須塗高係數防曬乳、穿長袖、撐陽傘。**服藥期間若皮膚長出新肉瘤、不明黑痣、腫塊，或傷口一直不會好，請務必告知醫師。
3. **手足症候群防範**：手掌與腳掌可能出現紅腫、疼痛、脫皮或皮膚顏色變深(色素沉著)。日常每天塗抹厚厚的保濕乳液或凡士林，並著寬鬆吸汗的棉襪與軟底鞋；洗澡時水溫切勿過燙，並避免用力搓洗手腳掌。

\*注意：從開始服藥的第一天起(皮膚都還好好的時候)，就要養成習慣，把皮膚的防禦力先補好，可以大幅降低後續發病的嚴重度。

4. **服藥期間禁止食用葡萄柚、葡萄柚汁、苦橙**或其果醬。苦橙(Bitter Orange)不同於日常食用的橘子、椪柑。苦橙味道極酸、帶有明顯苦味，通常不直接食用。通常用於果醬與香精。請檢查標籤是否含有苦橙萃取物。
5. **迫癌癒 Encorafenib 是個很容易跟其他藥物「打架」的藥。**不論是要去看身心科、心臟科、神經科(癲癇)，或是因為香港腳、灰指甲、嚴重感冒要吃抗生素，請務必主動把這款抗癌藥拿給



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師  
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/05/22 修訂】

BTC00ED49-02

Encorafenib 製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Encorafenib	Braftovi <sup>®</sup>	迫癌癒膠囊	75 毫克/膠囊

醫生看。千萬不要自己去西藥房買成藥、草藥或任何宣稱能調身體的保健食品(特別是聖約翰草成分)來吃。

6. 治療期間如果需要拔牙、植牙、做胃鏡大腸鏡切除息肉，或是安排任何外科手術，一定要提前告知主治醫師。臨床上通常會建議在手術前幾天「暫停服藥」，等傷口長好後再恢復吃藥，確保手術安全。

7. 育齡女性在治療期間及最後一次給藥後至少 1 個月內、男性患者在治療期間及最後一次給藥後至少 3 個月內，均應採取有效的避孕措施。

8. 全療程不可餵母乳，須至最後一次給藥(停藥)滿 2 週後方可恢復。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

\*過敏: 全身出現嚴重的紅疹、蕁麻疹，或伴隨嚴重的搔癢。發現嘴唇、舌頭、眼皮或喉嚨有明顯的腫脹感。覺得胸口悶、呼吸不順、喘不過氣，或聲音突然變得沙啞。

\*嚴重發炎與感染: 發燒(體溫高於 38°C)、畏寒、嚴重腹瀉(1 天超過 4-6 次)或劇烈腹痛。

\*不正常出血/胃腸道出血: 頻繁流鼻血且很難止住、刷牙時牙齦大量出血。吐血或吐出咖啡色渣狀物；排出黑便(像柏油路那樣黑亮)、血便；或是突發且持續的劇烈腹痛。

\*嚴重的眼睛不適(葡萄膜炎或視網膜病變): 突然眼睛紅腫疼痛、非常畏光、視力模糊、看東西變形、眼前黑點飛蚊變多或出現閃光。此為嚴重副作用，須立刻停藥並看眼科。

\*心臟無力(左心室功能不全): 稍微走動或躺平時就覺得呼吸困難、氣喘吁吁，或是出現雙腳、腳踝嚴重水腫。

\*腎損傷: 尿量明顯減少或甚至無尿；下肢、腳踝或全身嚴重水腫；不明原因的極度疲倦或噁心。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

\*高血壓: 需定期監測血壓，若數值持續偏高請紀錄並告知醫師。

\*角化過度症(皮膚變厚、粗糙)、皮疹、掉髮。

\*關節痛(或肌肉骨骼疼痛): 若痛到影響日常活動或休息，請告知醫師開立合適的止痛藥。

\*極度疲勞、腹痛、便秘、咳嗽、噁心想吐、頭痛或食慾變差。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師  
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/05/22 修訂】

BTC00ED49-02