

Trifluridine/ Tipiracil HCl 複方口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Trifluridine, Tipiracil HCl	Lonsurf	朗斯弗膜衣錠	Trifluridine: 15 毫克 , Tipiracil HCl: 7.065 毫克
			Trifluridine: 20 毫克 , Tipiracil HCl: 9.42 毫克

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 癌症用藥。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

2. 服用劑量依病人狀況調整。**每天兩次，飯後服用(飯後 1 小時內服用)。**

3. 其有獨特的給藥週期:[一個週期為 28 天]

✚ 第 1 和第 2 週:**5 天服藥 + 2 天休息。**

✚ 第 3 與第 4 週:**整整停藥 14 天**，讓身體的骨髓和血球休息恢復。

4. 請嚴格遵照醫師為您安排的停藥期，切勿自行更改。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥之成分有過敏病史者。

2. 孕婦或疑似懷孕之婦女。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

2. 如果吃完藥立刻吐了：請不要自行補吃，請直接算作「已經吃過這一次」，等到下一個正常的服藥時間，再依正常劑量服用下一劑即可，避免體內藥物濃度過高。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 化療期間會影響骨髓造血，必須遵照醫囑定期回醫院抽血監測白血球、血小板及紅血球數量。若居家出現發燒(體溫高於 38°C)、不明原因瘀青、皮下小紅點、流鼻血或解黑便等出血現象，請立即前往急診就醫。

2. 為**避免感染**，絕對不吃生魚片、生雞蛋(如半熟蛋、壽喜燒沾蛋液)、生菜沙拉。水果必須洗淨並去皮後再吃，不喝未經高溫煮沸的生水；每餐飯後及睡前使用軟毛牙刷輕輕刷牙，每次刷牙後可用煮沸過的溫開水或不含酒精的漱口水漱口；戴好口罩、勤洗手，盡量避免前往人潮擁擠的密閉空間。

3. 為**避免無故出血**，擤鼻涕時請輕柔，絕對不可用力挖鼻孔，以防鼻黏膜微血管破裂大流血；日常生活中剪指甲、刮鬍子(建議改用電動刮鬍刀)等動作請放慢，嚴防跌倒與劇烈碰撞。



本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/05/22】

BTC00ED50-02

Trifluridine/ Tipiracil HCl 複方口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Trifluridine, Tipiracil HCl	Lonsurf	朗斯弗膜衣錠	Trifluridine: 15 毫克 , Tipiracil HCl: 7.065 毫克
			Trifluridine: 20 毫克 , Tipiracil HCl: 9.42 毫克

4. 育齡女性在治療期間及最後一次給藥後至少 6 個月內、男性患者在治療期間及最後一次給藥後至少 6 個月內，均應採取有效的**避孕**措施。

5. 服用此藥期間及最後 1 次給藥後至少 1 天內，**不可餵母乳**。

腹瀉的居家處理：

- ✧ 若一天僅拉肚子 1~2 次，請先改吃清淡飲食(如白稀飯、白吐司)，並多補充水分。
- ✧ 若一天拉肚子達到 3 次以上，請遵照醫師開立的止瀉藥並且依照指示服用。
- ✧ 若一天連續拉超過 4 到 6 次，或出現頭暈、口乾等脫水症狀，請不要再自己狂吞止瀉藥，請立即前往急診就醫掛點滴。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

*過敏：全身出現嚴重的紅疹、蕁麻疹，或伴隨嚴重的搔癢。發現嘴唇、舌頭、眼皮或喉嚨有明顯的腫脹感。覺得胸口悶、呼吸不順、喘不過氣，或聲音突然變得沙啞。

*嚴重白血球低下：突發性發燒(耳溫或肛溫大於 38°C)或畏寒、發抖。血壓突然下降、心跳變極快。

➤ 一旦發燒，絕對不能自行吃退燒藥(如普拿疼)，因為這會掩蓋真正的發燒原由，讓急診醫師難以抓出感染源。請直接就醫，為您抽血檢查白血球。

*出血風險：全身上下無緣無故出現大量瘀青或出血點(像紫斑)；吐血、解黑便或血尿；牙齦流血不止。

*嚴重腹瀉(腸黏膜受損)：一天連續拉肚子超過 4 到 6 次以上，或是腹瀉嚴重到覺得頭暈、口乾舌燥、全身極度無力(這已是脫水與電解質流失的警訊)。

➤ 若一天連續拉超過 4 到 6 次，或出現頭暈、口乾等脫水症狀，請不要再自己狂吞止瀉藥，請立即前往急診就醫掛點滴。

*間質性肺炎(罕見)：在沒有感冒的狀況下，突然出現持續的乾咳(沒有痰)，且伴隨著逐漸加重的呼吸困難、呼吸很喘(甚至連坐著休息也喘)、胸悶或胸痛。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

*血色素減少(貧血)：臉色或翻開下眼瞼明顯變白失去血色、稍微走動就異常疲累、胸悶氣喘、突然站起時眼前一片黑。

*噁心、嘔吐、極度疲倦、落髮、口腔炎、味覺障礙等。



本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
 恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/05/22】

BTC00ED50-02

仿單查詢