

## Olaparib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Olaparib	Lynparza	令癌莎	150 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 癌症用藥。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 必須整顆吞服。不可壓碎、切半、嚼碎、溶解或剝開膠囊/藥錠。隨餐或空腹。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 過敏。
2. 孕婦或疑似懷孕之婦女。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 30°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 因為藥物會讓抵抗力變差，這段時間請勤洗手、出入公共場所戴口罩，吃東西要吃全熟食。
2. 此藥可能引起疲倦或暈眩，在身體能適應藥物前，開車、騎車或操作機械應小心操作。
3. 這個抗癌藥令癌莎非常特別，它在我們體內主要是透過一種叫做 **CYP3A** 的肝臟酵素來代謝。所以，有些藥物或食物會跟它產生嚴重的衝突，我們醫學上稱為『強效 **CYP3A** 抑制劑』或『強效 **CYP3A** 誘導劑』，請您在開始吃藥前，把您現在點的所有藥列一張清單，或者把藥袋直接帶過來，給主治醫師看過，確認有沒有跟這個抗癌藥衝突。
4. 服藥期間禁止食用葡萄柚、葡萄柚汁、苦橙或其果醬。苦橙(Bitter Orange)不同於日常食用的橘子、極柑。苦橙味道極酸、帶有明顯苦味，通常不直接食用。通常用於果醬與香精。請檢查標籤是否含有苦橙萃取物。
5. 需在治療前及治療期間(每月一次)抽血監測血球狀況。
6. 如果接下來這幾個月，有計畫要去拔牙、植牙、做胃鏡大腸鏡切除肉，或者是任何大大小小的手術，請『務必』先告訴醫生。因為這個藥會讓血小板變低、凝血變慢，需要評估是不是需要提前停藥，
7. 孕齡婦女請避孕至停藥 6 個月後。孕齡男士請避孕(保險套是必須的)至停藥 3 個月後(這段期間內的精子可能含有藥物成分，絕對不可捐贈精子)。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師  
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/05/22 修訂】

BTC00ED52-02

### Olaparib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Olaparib	Lynparza	令癌莎	150 毫克/錠

8. **哺乳**請至停藥 1 個月後。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

\*過敏：全身出現嚴重的紅疹、蕁麻疹，或伴隨嚴重的搔癢。發現嘴唇、舌頭、眼皮或喉嚨有明顯的腫脹感。覺得胸口悶、呼吸不順、喘不過氣，或聲音突然變得沙啞。

\*白血球/嗜中性球減少：如果出現發燒超過 38°C、全身發冷顫抖、或是有嚴重的咳嗽、小便灼熱感等感染症狀，請不要自行服用退燒藥，請立即就醫。

\*血小板減少：異常瘀青、血尿或血便。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

\*貧血(非常常見)：疲倦、頭暈、臉色蒼白或走幾步路就喘。

\*噁心、嘔吐、食慾不振、味覺改變、腹瀉或便秘。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師  
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/05/22 修訂】

BTC00ED52-02