

Pazopanib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Pazopanib	Votrient	福退癌膜衣錠	200 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 腎細胞癌、軟組織肉瘤。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

2. 空腹時服用，至少於用餐前 1 小時或用餐後 2 小時。

3. 請勿壓碎藥錠。

4. 禁止服用葡萄柚汁。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 過敏。

2. 重度肝功能不全的患者。

3. 孕婦或疑似懷孕之婦女。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 30°C 以下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 按醫師指示定期抽血監測肝功能(ALT / AST / 膽紅素)，還有監測心電圖，且應維持電解質(例如：鈣、鎂、鉀)濃度在正常範圍內。

2. 定時量血壓，血壓有升高現象請就醫；另外，每天固定時間量體重，注意體重有沒在 1 天內突然增加 1~2 公斤，且需要端坐著才有辦法睡著，以免因藥物致心衰竭。

3. 服藥期間頭髮顏色可能會改變，停藥後會恢復正常。

4. 福退癌會影響凝血，若患者尚未停經，可能會經血量暴增。

5. 本藥會嚴重影響凝血與傷口癒合，若有安排拔牙、切片或任何手術，請務必先請醫生評估，通常術前至少 7 天必須停藥，且術後需等傷口癒合完全才能恢復服藥。

6. 禁止食用葡萄柚、大白柚、文旦、苦橙(含果汁、果醬)，避免藥物濃度暴增引發毒性。

7. 避免使用 PPI 類製酸劑(像本院的泰克胃通 Lansoprazole、保衛康治潰樂 Pantoprazole)。若必須使用抑酸劑，建議改用短效制酸劑(像胃乳片、胃散)，並與本藥間隔 2 小時以上再服用。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/5/22 修訂】

BTC00ED53-02

Pazopanib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Pazopanib	Votrient	福退癌膜衣錠	200 毫克/錠

8. 福退癌的血中濃度很容易受到特定抗黴菌藥、抗病毒藥或抗生素(CYP3A4 抑制劑或誘導劑)的干擾而影響療效與安全性，因此**合併使用其他藥物前，務必先與醫師或藥師確認**。

9. 治療期間至停止治療後兩週內應採取適當的**避孕**措施以避免懷孕，也**不得哺乳**。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

*過敏：全身出現嚴重的紅疹、蕁麻疹，或伴隨嚴重的搔癢。發現嘴唇、舌頭、眼皮或喉嚨有明顯的腫脹感。覺得胸口悶、呼吸不順、喘不過氣，或聲音突然變得沙啞。

*高血壓與中風風險：劇烈頭痛、頭暈、視力模糊；胸悶、心悸；單側手腳無力、言語不清(中風徵兆)。

*肝細胞嚴重受損：早期：極度疲倦、食慾不振、持續噁心嘔吐、右上腹悶痛。後期：眼白或皮膚變黃(黃疸)、尿液變成深茶色/可樂色、大便變成灰白色。

*心臟毒性(心衰竭)：活動或躺平時變得很喘(呼吸困難)，甚至需要墊高枕頭或坐著才能呼吸。下肢(腳踝、小腿)明顯水腫，按壓凹陷；1~2 天內體重突然暴增 1~2 公斤(體內積水)。

*胃腸壁破裂、發炎：突發且劇烈的腹痛、伴隨發燒、噁心、嘔吐。

*異常出血：常常莫名其妙流鼻血、牙齦出血。咳血、吐血、大便變黑或帶血。皮膚沒碰撞卻出現大片瘀青。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

*腹瀉、噁心、疲勞、輕微皮疹、失眠。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/5/22 修訂】

BTC00ED53-02