

Sunitinib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Sunitinib	Sutent	紓癌特膠囊	12.5 毫克/顆

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 腫瘤治療劑。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

2. 藥錠應整顆吞服，不可打開或壓碎，以免影響藥效與安全性。

3. 服藥後如果沒症狀就自行固定時間服用就好。

4. 如果容易反胃，建議飯後 1 小時內或睡前吃。

*如果空腹吃覺得胃怪怪的、一直想吐，就改到「飯後服用」。

*如果白天吃依然吐得很厲害，會建議改到「睡前吃」，讓嚴重的反胃期在睡夢中渡過。

5. 服藥期間避免食用葡萄柚或飲用葡萄柚汁。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 過敏。

2. 若有鬱血性心衰竭的建議停用。

3. 孕婦或疑似懷孕之婦女。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 本藥易引發高血壓。請每天早晚固定量下血壓，並記錄在小本子上。若發現血壓異常飆高，或出現莫名胸悶、心悸、喘不過氣，請務必提早回診。

2. 此藥會讓體內白血球及血小板下降，請務必遵照醫囑定期回院抽血。若出現發燒(耳溫或肛溫大於 38°C)、嚴重畏寒，或是身上莫名出現大片瘀青、牙齦或傷口流血不止，請立即就醫。

3. 手足症候群防範：手掌與腳掌可能出現紅腫、疼痛、脫皮或皮膚顏色變深(色素沉著)。日常每天塗抹厚厚的保濕乳液或凡士林，並著寬鬆吸汗的棉襪與軟底鞋；洗澡時水溫切勿過燙，並避免用力搓洗手腳掌。

4. 可能出現口腔潰瘍或吃東西沒味道、嘴巴有金屬味。建議使用柔軟牙刷輕輕刷牙，多用溫



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/05/22 修訂】

BTC00ED56-02

Sunitinib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Sunitinib	Sutent	紓癌特膠囊	12.5 毫克/顆

開水漱口，並避開太辣、太酸等刺激性食物。

5. **腹瀉**期間請避免油膩、高纖維或奶製品，多補充水分與電解質。若一天拉肚子超過 4~6 次，或是疲倦到連下床的力氣都沒有，必須提早回診。
6. 可能**導致皮膚或尿液呈現黃色**，這不是黃疸，不代表肝臟有問題，停藥休息後就會自然消失。
7. **頭髮或毛髮可能變白或變淡**。因為有些適應症(如腎癌、胃腸道基質瘤)是吃 4 週然休息 2 週，可能會長出黑白相間、像斑馬線般的頭髮(吃藥時長白髮、停藥休息時長黑髮)，這都是藥物作用的正常現象。
8. **服藥期間禁止食用葡萄柚、葡萄柚汁、苦橙**或其果醬。苦橙(Bitter Orange)不同於日常食用的橘子、椪柑。苦橙味道極酸、帶有明顯苦味，通常不直接食用。通常用於果醬與香精。請檢查標籤是否含有苦橙萃取物。
9. 本藥與許多藥物會產生**交互作用**，特別是某些「**肺結核藥物**」或「**抗癲癇藥**」(會讓本藥完全失效)或是「特定**抗黴菌藥/抗生素**」(會讓本藥毒性暴增)。請務必主動告知醫師您正在服用這款標靶藥物，並核對處方。
10. 無論男性或女性患者，在治療期間以及最後一次給藥後的至少 1 個月內，都必須嚴格採取有效的**避孕**措施，且此期間**不可以哺乳**。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. **如發生以下症狀時，請立即就醫**

- ***過敏**: 全身出現嚴重的紅疹、蕁麻疹，或伴隨嚴重的搔癢。發現嘴唇、舌頭、眼皮或喉嚨有明顯的腫脹感。覺得胸口悶、呼吸不順、喘不過氣，或聲音突然變得沙啞。
- ***低血糖**: 突然莫名手抖、冒冷汗、強烈飢餓感、心跳加速、頭暈。
- ***鬱血性心衰竭/QT 間期延長與 TdP**: 突然嚴重胸悶、心跳漏一拍或像小鳥亂跳(心律不整)、莫名暈厥(當場昏倒)、稍微平躺就喘不過氣、下肢突然嚴重水腫。
- ***出血事件與臟器破裂**: 如咳血、吐血、解黑便(如同黑亮柏油，代表胃腸道出血)。若腹部腫瘤破裂，會出現突發性、像刀割一樣的劇烈腹痛。
- ***蛋白尿**: 小便泡泡大量增加，且過了 5-10 分鐘都不會消退(泡泡尿)，或雙腳水腫。
- ***肝毒性**: 眼白皮膚變黃(要注意與藥物本身引起的皮膚變黃區隔)、右上腹部疼痛、極度疲倦。
- ***顎骨壞死(罕見但極嚴重)**: 服藥期間絕對不能拔牙或做植牙等侵入性牙科手術。若有看牙需求，必須提前告知醫師。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
 思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/05/22 修訂】

BTC00ED56-02

Sunitinib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Sunitinib	Sutent	紓癌特膠囊	12.5 毫克/顆

***腫瘤溶解症候群(罕見但極嚴重):** 好發在腫瘤體積非常大、用藥後腫瘤快速壞死的病人。若出現尿量突然變極少、肌肉抽搐、心悸等症狀，代表有高血鉀與急性腎衰竭的危險，請立即就醫。

***血栓性微血管病變(罕見但極嚴重):** 會引發微血管內血栓導致溶血與腎衰竭。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

***高血壓控制不佳:** 劇烈頭痛、頭暈、後腦勺緊痛。

***甲狀腺功能低下:** 無緣無故手腳冰冷、極度怕冷、體重無故增加、皮膚極度乾燥、全身水腫或反應變慢。

***腹瀉、噁心、嘔吐、味覺改變(嘴巴苦苦、有金屬味)。** 手足皮膚反應。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/05/22 修訂】

BTC00ED56-02