

Sorafenib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Sorafenib	Nexavar	蕾莎瓦膜衣錠	200 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 腫瘤治療劑。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

2. **不與食物一起服用(至少用餐前 1 小時或用餐後 2 小時)**。

3. 藥錠應配水整顆吞服，不可壓碎或嚼碎。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 過敏。

2. 使用 carboplatin 和 paclitaxel 治療鱗狀細胞肺癌者。

3. 孕婦或疑似懷孕之婦女。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 30°C 以下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服藥期間，每個月都必須按時回院抽血監測肝功能。醫師會根據您的肝指數調整藥物劑量，請務必配合。

2. 為了確保您的心臟安全，服藥期間請配合醫師安排，定期在門診進行心電圖檢查並抽血檢查電解質(如血液中的鉀、鎂離子濃度)。

3. 服藥期間請每天**早晚固定量血壓**並記錄。若發現血壓異常飆高，請主動告知醫師。

4. **手足症候群**防範：手掌與腳掌可能出現紅腫、疼痛、脫皮或皮膚顏色變深(色素沉著)。日常每天塗抹厚厚的保濕乳液或凡士林，並著寬鬆吸汗的棉襪與軟底鞋；洗澡時水溫切勿過燙，並避免用力搓洗手腳掌。

5. 本藥會影響傷口癒合。**若近期計畫進行任何手術或拔牙，務必提早告知醫師以評估是否需要提前停藥。**

6. 本藥與許多藥物會產生嚴重衝突。特別是某些「**肺結核藥物**」、「**抗癲癇藥**」或是市售草藥(如**聖約翰草**)，它們會加速本藥在體內的代謝，導致蕾莎瓦完全失去抗癌療效。看其他科別時，請主動告知醫師您正在服用這款標靶藥物；服藥期間也請勿自行服用中草藥與成分不明的



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/05/22 修訂】

BTC00ED57-02

Sorafenib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Sorafenib	Nexavar	蕾莎瓦膜衣錠	200 毫克/錠

保健食品。

7. 女性患者在治療期間及最後一劑後至少 6 個月內應採取高效**避孕**措施。此期間也絕對不可以哺乳。
8. 男性患者在治療期間，以及服用最後一劑藥物後的至少 3 個月內應採取**避孕**措施。請**勿捐贈精子**。
9. 服用此藥期間及最後一次給藥後至少半個月(14 天)內，**不可餵母乳**。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- *過敏：全身出現嚴重的紅疹、蕁麻疹，或伴隨嚴重的搔癢。發現嘴唇、舌頭、眼皮或喉嚨有明顯的腫脹感。覺得胸口悶、呼吸不順、喘不過氣，或聲音突然變得沙啞。
- *QT 間隔延長：突然心跳漏一拍、心悸，或是無緣無故劇烈頭暈、甚至當場暈厥（昏倒），請立即停藥並直接就醫。
- *肝炎或肝損傷：眼白(鞏膜)與皮膚明顯變黃(黃疸)、茶色尿(深到像濃茶、烏龍茶或可樂)、右上腹疼痛。突然變得極度疲倦、嚴重噁心、嘔吐、或胃口完全喪失。
- *嚴重出血與臟器穿孔：大量鼻血、牙齦流血不止、咳血、吐血、或是解黑便(如同黑亮柏油)；若出現突發性、像刀割一樣的劇烈腹痛(胃腸道穿孔風險)，請立即就醫。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

- *高血壓(用藥初期極常見)：血壓異常飆高，或伴隨劇烈頭痛、頭暈、後腦勺緊痛。
- *皮疹、乾燥脫皮、或是手足皮膚反應(手掌與腳掌出現紅腫、疼痛、起水泡)。
- *疲倦、體重減輕、食慾減退、腹瀉、噁心、掉髮。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/05/22 修訂】

BTC00ED57-02