

Tegafur/Gimeracil/Oteracil-K 複方口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Tegafur, Gimeracil, Oteracil-K	TS-1 (20) cap	愛斯萬膠囊	T 20 毫克, G 5.8 毫克, O 19.6 毫克

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 癌症用藥。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

2. 服用劑量依病人狀況調整。**每天兩次，飯後服用(飯後 1 小時內服用)**。

*因為本藥特有的腸胃保護成分:**Oteracil-K**，必須在飯後胃腸有食物的環境下才能發揮最佳保護力。如果空腹服用，保護效果會打折，極易引發嚴重的胃腸潰瘍或腹瀉。

3. 其有獨特的給藥週期：**4 週服藥+2 週休息**。請嚴格遵照醫師為您安排的停藥期，切勿自行更改。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥之成分有過敏病史者。

2. 有嚴重骨髓抑制者。

3. 有嚴重腎功能障礙者。

4. 有嚴重肝功能障礙者。

5. 孕婦或疑似懷孕之婦女。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 化療期間會影響骨髓造血，必須遵照醫囑定期回醫院抽血監測白血球、血小板及紅血球數量。若居家出現發燒、不明原因瘀青或出血，請立即就醫。

2. **手足症候群**防範：手掌與腳掌可能出現紅腫、疼痛、脫皮或皮膚顏色變深(色素沉著)。日常應加強皮膚保濕(塗抹乳液)，並著寬鬆鞋襪、減少患部摩擦。

3. 本藥的**代謝物會隨淚液排泄**，容易刺激眼睛導致淚囊發炎或淚道阻塞。若出現莫名流眼淚、眼睛紅痛、視力模糊，請主動諮詢眼科；早期處理可避免永久性淚道阻塞。

4. 為**避免感染**，絕對不吃生魚片、生雞蛋(如半熟蛋、壽喜燒沾蛋液)、生菜沙拉。水果必須洗淨並去皮後再吃，不喝未經高溫煮沸的生水；每餐飯後及睡前使用軟毛牙刷輕輕刷牙，每



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/05/22 修訂】

BTC00ED58-02

Tegafur/Gimeracil/Oteracil-K 複方口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Tegafur, Gimeracil, Oteracil-K	TS-1 (20) cap	愛斯萬膠囊	T 20 毫克, G 5.8 毫克, O 19.6 毫克

次刷牙後可用煮沸過的溫開水或不含酒精的漱口水漱口；戴好口罩、勤洗手，盡量避免前往人潮擁擠的密閉空間。

5. 為**避免無故出血**，擤鼻涕時請輕柔，絕對不可用力挖鼻孔，以防鼻黏膜微血管破裂大流血；日常生活動作請放慢，嚴防跌倒與劇烈碰撞。
 6. 育齡女性在治療期間及最後一次給藥後至少 6 個月內、男性患者在治療期間及最後一次給藥後至少 3 個月內，均應採取有效的**避孕**措施。
 7. 整個療程中絕對**不可餵母乳**。若要恢復哺乳，必須在吃完最後一顆藥(停藥)滿 2 週之後。
- ✚ 換藥時必須空窗 7 天：

如果您因為療效調整，醫生要幫您把本藥換成**其他化療藥**(如：截瘤達 Xeloda、友復 UFUR、5-FU 針劑)或是**特殊的抗黴菌藥**(如本院的弗路欣錠 Flucytosine)，本藥愛斯萬與上述藥品中間絕對不能接著吃，必須「完全停藥休息至少 7 天」。如果沒有空窗 7 天，新藥的毒性會成倍暴增。去各大醫院看其他科別(特別是感染科、皮膚科)時，請務必把這張衛教單或藥袋拿給醫生看，告知您正在或剛停用這款化療藥。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- *過敏：全身出現嚴重的紅疹、蕁麻疹，或伴隨嚴重的搔癢。發現嘴唇、舌頭、眼皮或喉嚨有明顯的腫脹感。覺得胸口悶、呼吸不順、喘不過氣，或聲音突然變得沙啞。
- *骨髓抑制(嚴重感染)：突發性發燒(耳溫或肛溫大於 38°C)或畏寒、發抖。血壓突然下降、心跳變極快。
 - 一旦發燒，絕對不能自行吃退燒藥(如普拿疼)，因為這會掩蓋真正的發燒原由，讓急診醫師難以抓出感染源。請直接就醫，為您抽血檢查白血球。
- *泛發性血管內血液凝固症：全身上下無緣無故出現大量瘀青或出血點(像紫斑)；吐血、解黑便或血尿；牙齦流血不止。
- *間質性肺炎：沒有感冒，卻出現持續的乾咳(沒痰)，且伴隨逐漸加重的呼吸困難、呼吸很喘(甚至坐著也喘)、胸悶或胸痛。
- *B 型肝炎再活化(猛爆性肝炎風險)：早期：極度疲倦、莫名全身無力、食慾不振、噁心、想吐。後期：眼白或皮膚明顯變黃(黃疸)、尿液顏色深得像濃茶或可樂。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

- *厭食、腹瀉、腹痛、便秘、頭暈等。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/05/22 修訂】

BTC00ED58-02

Tegafur/Gimeracil/Oteracil-K 複方口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Tegafur, Gimeracil, Oteracil-K	TS-1 (20) cap	愛斯萬膠囊	T 20 毫克, G 5.8 毫克, O 19.6 毫克

*血色素減少(貧血):臉色或翻開下眼瞼明顯變白失去血色、稍微走動就異常疲累、胸悶氣喘、突然站起時眼前一片黑。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/05/22 修訂】

BTC00ED58-02