

Methylphenidate 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Methylphenidate	methyDUR®	思有得持續膠囊	22 毫克/膠囊

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

治療注意力不足過動症。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 於**每天早餐後約 20 分鐘內與開水整顆吞服**，切勿咀嚼、剝半或壓碎。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 已知會對本藥活性成分或對任何賦形劑過敏者。
2. 青光眼。
3. 明顯焦慮、緊張和激躁不安者。
4. 動作型不自主抽動或具妥瑞氏症家族史或診斷者。
5. 使用 MAOI 治療中或停藥未滿 14 天者。
6. 已知心臟有結構性異常、心肌病變、嚴重心臟節律異常、冠狀動脈疾病或有嚴重心臟疾病。
7. 六歲以下兒童。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下。

◆ **注意事項：**

1. 服用此藥可能造成暈眩、困倦、視力模糊或視力調節困難，**開車、操作機械**或從事其他具危險性的活動**應小心注意**。
2. 本藥可能會引發周邊血管問題。四肢可能會感到麻木、冰冷、疼痛、顏色可能會從蒼白變為藍色或紅色。
3. 長期服用可能會孩童生長趨緩，**兒童需定期追蹤身高體重**發展。
4. 若您有其他疾病、懷孕或計畫懷孕、正在服用的藥品，請告知醫師。
5. 若出現陰莖勃起異常或疼痛時，請立即就醫。
6. 如果出現情緒異常波動、易怒、攻擊行為、敵意、幻覺、自殺行為或意念，請即刻就醫。
7. 本藥會使血壓和心率些微上升，服藥期間應**定期測量血壓與心跳**。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

*過敏：全身突發紅疹、嚴重搔癢；嘴唇、舌頭、眼皮或喉嚨明顯腫脹；或出現吞嚥困難、喘不



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/6/3 修訂】

BTC00EG26 -02

Methylphenidate 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Methylphenidate	methyDUR®	思有得持續膠囊	22 毫克/膠囊

過氣、聲音沙啞。

*陰莖勃起異常:出現異常持續性、經常性且伴隨疼痛的勃起時。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

*四肢出現新增加的麻木、疼痛或冰冷感。膚色變白、變紅或變藍。

*食慾下降、上腹痛、嘔吐、頭痛、失眠。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/6/3 修訂】

BTC00EG26 -02