

Celecoxib 口服製劑衛教單張

| 學名 | 商品名 | 中文名 | 含量/劑型 |
|-----------|------------------------|-------|-----------|
| Celecoxib | Celebrex [®] | 希樂葆膠囊 | 200 毫克/膠囊 |
| | Celecolen [®] | 息骨能膠囊 | |

◆ 用途：(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

緩解骨關節炎之症狀與徵兆，緩解成人類風濕性關節炎之症狀與徵兆，緩解成人急性疼痛及治療原發性經痛，緩解僵直性脊椎炎之症狀與徵兆。

◆ 用量與用法：

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。

◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：

1. 曾因服用本藥或其他非類固醇類止痛消炎藥、阿斯匹靈(如本院的伯基 Bokey)而引發氣喘、蕁麻疹或急性過敏反應者。

2. 對磺胺類藥物(如本院的燙膚舒乳膏與使立復乳膏 Silver sulfadiazine、止膿敏點眼液 Sulfamethoxazole、撲菌特錠 Co-trimoxazole、瑪爾胰錠 Glimepiride、利控糖膜衣錠 Glimet[®]、樂泄錠 Furosemide、必得寧錠 Bumetanide、撒樂腸溶錠 Sulfasalazine、乙醯氮胺片 Acetazolamide)過敏者。

3. 進行冠狀動脈繞道手術後 14 天內禁用。

4. 孕期 ≥ 30 週(第 3 孕期)之孕婦，如使用會有胎兒動脈導管過早閉合的風險。

◆ 忘記服藥時該如何處理？

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ 藥品儲存：

1. 儲存環境：儲存於 25°C 以下。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ 注意事項：

1. 如果您已經懷孕、計畫懷孕、正在哺乳，或有心血管疾病、肝腎疾病、胃潰瘍、氣喘、貧血、出血問題，請務必主動告知醫師。

2. 請告知醫師您目前正在服用的所有藥物(包含其他醫院開的藥、止痛藥、中藥)。

3. 如果您需要長期服用此藥，醫師會為您安排抽血(檢查肝腎功能)與糞便潛血反應等檢驗(檢查腸胃道有沒有微量出血)。請配合完成檢查。

4. 服用期間若併服 warfarin、其他抗凝血劑及抗血小板等藥品，請告知醫師。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

*過敏：全身出現嚴重的紅疹、蕁麻疹，或伴隨嚴重的搔癢。發現嘴唇、舌頭、眼皮或喉嚨有明顯的腫脹感。覺得胸口悶、呼吸不順、喘不過氣，或聲音突然變得沙啞。

*心臟不適(心肌梗塞)：突然劇烈胸悶、胸痛，且疼痛延伸到左肩或下巴。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2026/06/08 修訂】

BTC00EH04-02

Celecoxib 口服製劑衛教單張

| 學名 | 商品名 | 中文名 | 含量/劑型 |
|-----------|------------------------|-------|-----------|
| Celecoxib | Celebrex [®] | 希樂葆膠囊 | 200 毫克/膠囊 |
| | Celecolen [®] | 息骨能膠囊 | |

- *中風風險: 突然出現單側手腳無力、嘴角歪斜, 或說話口齒不清。
- *腎臟損傷: 尿量突然大幅減少, 或臉部、眼瞼及雙腳出現明顯水腫。
- *肝指數升高: 出現不明原因的極度疲倦、噁心嘔吐、皮膚或眼白發黃(黃疸)。
- *胃腸出血: 出現不明原因劇烈腹痛, 或解柏油狀黑便、吐出咖啡渣狀物。
- *嚴重皮膚反應 SJS (罕見但嚴重): 出現不明發燒、全身肌肉酸痛、極度疲倦、喉嚨痛嘴破, 伴隨眼睛紅腫、皮膚長水泡或脫皮。

2. 如以下症狀嚴重且持續時, 請告知醫師

- *腹瀉、消化不良。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊, 若您仍有其他相關問題, 請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線: 26723456 轉 7150。【2026/06/08 修訂】

BTC00EH04-02