

Evocalcet 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Evocalcet	Orkedia®	益副蓋錠	2 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
治療患慢性腎臟病且接受透析之成人病人的次發性副甲狀腺機能亢進症。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 已知會對本藥活性成分或對任何賦形劑過敏者。
 2. 懷孕或可能懷孕之婦女。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
 1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：室溫保存。
- ◆ **注意事項：**
 1. 服藥期間請配合醫療團隊，定期回診及接受抽血檢查。
 2. 若您正在使用治療骨質疏鬆的用藥或類固醇類藥品，請主動告知醫師。
 3. 若您患有肝臟疾病、癲癇、心律不整，懷孕或計畫懷孕，請主動告知醫師。
 4. 用藥期間不建議哺乳。
 5. 用藥期間若出現皮膚感覺異常、肌痛、抽筋或癲癇等症狀，請告知醫師。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
 - *過敏：全身突發紅疹、嚴重搔癢；嘴唇、舌頭、眼皮或喉嚨明顯腫脹；或出現吞嚥困難、呼吸喘、聲音沙啞。
 - *低血鈣相關危急症狀：手腳或嘴唇異常麻木感、手腳抽筋(肌肉痙攣)、心悸或心律不整。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
 - *腸胃道與口腔黏膜症狀：噁心、嘔吐、腹脹、食慾不振、牙齦炎、口腔炎。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/6/3 修訂】

BTC00EM50-02