

Abiraterone acetate 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Abiraterone acetate	Zytiga®	澤珂錠	250 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

治療前列腺癌。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師處方與指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 固定時間 **空腹服用(服用本品前至少 2 小時和服藥後至少 1 小時不可進食)**。
3. 藥錠請勿壓碎或嚼碎，須整粒吞服。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

已知會對本藥過敏者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 請儲存於 30°C 以下。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. **服用本藥會搭配類固醇(prednisone或prednisolone，像本院的康速龍錠)一起服用，請勿自行停藥。**
2. 請定期回診監測**肝功能**，並注意是否出現**血壓上升、水腫或體重增加**，請定期監測血壓及體重。
3. 本藥可能與其他藥品發生交互作用，若有服用其他藥品(如癲癇、結核或血糖用藥)，請告知醫師。
4. 服用口服降血糖藥品者，請監測血糖並注意低血糖症狀。
5. 有具生育能力之女性伴侶的**男性**病人，在治療期間及投予最後 1 劑後的 3 週之內，應採取有效的**避孕**措施。
6. **已懷孕或可能懷孕的女性，不可在沒有防護措施(如手套)的情況下碰觸澤珂錠。**

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. **如發生以下症狀時，請立即就醫**

*急性過敏反應：呼吸困難、蕁麻疹、呼吸急促、意識混亂。

*腎上腺功能不全：嚴重的胃部不適或嘔吐、嚴重的頭暈或昏厥、肌肉無力、極度疲勞、情緒波動、食慾不振或體重減輕。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/6/4 修訂】

BTC00ED22-02

Abiraterone acetate 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Abiraterone acetate	Zytiga®	澤珂錠	250 毫克/錠

*肝功能變化：深色尿、灰白色糞便、皮膚或眼白泛黃等。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

*尿道感染、頭痛、發燒。周邊水腫、血壓上升、關節疼痛。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/6/4 修訂】

BTC00ED22-02