

Fentanyl 貼片製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	藥品釋放速率，含量
Fentanyl	Opiodur transdermal patch	歐必德穿皮貼片劑	12 微公克/小時，1.375 毫克/片
			25 微公克/小時，2.75 毫克/片
			50 微公克/小時，5.5 毫克/片

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 需要使用類鴉片製劑控制的慢性疼痛和頑固性疼痛。。

◆ **用量與用法：**

1. 一片貼 72 小時 (3 天)。醫師會依個別狀況調整貼片量，請依醫師指示使用。
2. 每次貼上或撕下貼片都應記錄於使用紀錄表。使用紀錄表請於回診時攜回，先給醫師檢視用藥情形並蓋章後，連同使用過的廢片或不再使用的新片交還藥局。

黏貼部位：

- ✓ 清潔、乾燥、完整健康之軀幹或上臂的皮膚上。最好選擇無毛髮部位，若無可避免，可用剪刀修剪毛髮，勿用刮或剃的方式以免皮膚受傷。
- ✓ 可貼於前胸、後背、上手臂、大腿等平坦處。對兒童而言，上背部不易移除是最佳部位。
- ✓ 每次應更換黏貼部位以減少皮膚不適。同一部位應相隔數日。
- ✗ 不可貼於發紅、受刺激、割傷的皮膚或放射治療部位。
- ✗ 不可貼於剛擦乳霜、乳液、或粉末的皮膚。
- ✗ 不可貼於會因穿著而磨擦掉貼片部位或皮膚皺摺處。

使用方法：

- ↓ 將黏貼部位用清水洗淨，並待皮膚完全乾燥。勿用肥皂、油、乳液清洗。
- ↓ 剪開外包裝並取出貼片，貼片不可剪裁。
- ↓ 撕下覆蓋貼片印刷面的透明保護膜。
- ↓ 從覆蓋貼片黏著層的透明保護膜上小心地剝下一角，並取下貼片(避免接觸到貼片的黏著層)



剪開外包裝並取出貼片

撕下印刷面上層保護膜

從下層保護膜上剝下貼片
(先剝一小角再小心撕下，
勿碰觸貼片黏著層)

- ↓ 將貼片貼上皮膚，用手掌輕壓 30 秒，確保貼片完全緊貼於皮膚，也可使用透氣膠帶黏貼於貼片邊緣。
- ↓ 以清水洗淨雙手，並記錄貼片貼上時間於使用紀錄表。
- ↓ 72 小時(3 天)之後，撕下貼片並將黏著層向內對折，放入原包裝袋(不可丟棄，回診時應連同記錄表繳回藥局)。
- ↓ 以清水洗淨雙手，並記錄貼片撕除時間於使用紀錄表。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/7/17 修訂】

BTC00EH19-02

Fentanyl 貼片製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	藥品釋放速率，含量
Fentanyl	Opiodur transdermal patch	歐必德穿皮貼片劑	12 微公克/小時，1.375 毫克/片
			25 微公克/小時，2.75 毫克/片
			50 微公克/小時，5.5 毫克/片

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對 fentanyl 或賦形劑過敏之病患。

◆ **忘記使用時該如何處理？**

1. 想起時盡快使用，72 小時(3 天)後再更換。
2. 除非醫師指示同時使用二片，否則不可同時貼二片。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人。

◆ **注意事項：**

1. 貼片使用期間可洗澡(以淋浴方式)、游泳，但避免貼片長時間接觸熱源，如加熱墊、電毯、加熱水床、加熱燈、密集日光浴、熱水瓶、長時間的熱水浴、芬蘭蒸氣浴及熱循環水療。
2. 若貼片不慎脫落或黏貼部位產生刺激，可撕下重新黏貼於不同部位，視情況可使用透氣膠帶加強固定。
3. 貼片不可分開、切割或破壞，以免影響藥物釋出。
4. 用過的舊貼片及不再使用的新貼片應連同使用紀錄表繳回藥局。
5. 體溫上升可能會導致過多藥物進入您體內。若您發燒，請告知您的醫師，若發生嚴重嗜睡、呼吸困難、呼吸過緩或淺呼吸，請撕下貼片立即就醫。
6. 使用本藥應避免和酒精或中樞神經抑制劑(安眠、過敏、感冒藥等)併服，因會增加中樞神經方面的副作用，如嗜睡。
7. 本藥可能會導致嗜睡、頭昏、暈眩，尤其是初次使用。不要開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。
8. 長期使用可能會發生便秘的情形，多吃富含纖維素的食物及適度的運動可幫助改善，若仍不能改善，可與醫師討論是否需要使用軟便劑或瀉劑。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
嚴重嗜睡、嚴重眩暈、昏厥、換氣不足、呼吸困難、意識混亂、低血壓。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
排尿困難、幻覺、皮膚紅疹、皮膚搔癢、噁心、嘔吐。