

Oxycodone HCl 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Oxycodone HCl	Oxycodone HCl®	鹽酸羥可酮速效膠囊	5 毫克/膠囊

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

麻醉性鎮痛劑。

- ◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 整粒吞服(膠囊不可打開)。

- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 已知會對本藥活性成分或對任何賦形劑過敏者。
2. 嚴重呼吸抑制。
3. 急性或嚴重支氣管氣喘未接受監測或無急救設備。
4. 已知或疑似麻痺性腸阻塞及腸胃道阻塞。
5. 不建議用於未滿 18 歲的兒童病人。

- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

- ◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：儲存於 30°C 以下。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

- ◆ **注意事項：**

1. 服用本藥時請小心駕車及操作機械。
2. 請監測呼吸抑制症狀，且在開始治療及提高劑量時特別留意。
3. 本藥品可能會與其他藥品發生交互作用，就醫時請主動告知醫師您目前正在使用的所有藥品，或您正在服用該藥品，以利維護用藥安全。
4. 懷孕、可能懷孕或正在餵母乳的媽媽，請務必在開藥前主動告知醫生。
5. 長期使用鴉片類藥物可能導致不孕。目前未知此對生殖能力的影響是否可回復
6. 如果您覺得不痛了想減藥，或者吃了不舒服，請務必告知醫療團隊。團隊會量身打造一個『漸進式減量計畫』，讓大腦和身體慢慢適應，安全地把藥量降下來。

- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

*過敏：全身突發紅疹、嚴重搔癢；嘴唇、舌頭、眼皮或喉嚨明顯腫脹；或出現吞嚥困難、呼吸喘、聲音沙啞。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/6/30 修訂】

BTC00EH20-02

Oxycodone HCl 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Oxycodone HCl	Oxycodone HCl®	鹽酸羥可酮速效膠囊	5 毫克/膠囊

*呼吸抑制症狀：呼吸速率極慢，或者出現喘息、呼吸不規則、甚至短暫停止；極度嗜睡、無法喚醒、瞳孔極度縮小、全身肌肉無力；嘴唇、舌頭、指甲床或皮膚呈現發青、發紫或蒼白。

*嚴重低血壓：收縮壓顯著低於正常值、心跳過慢與昏厥。

*癲癇發作：全身突然僵硬、劇烈抽搐、翻白眼、口吐白沫且失去意識。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

*戒斷症狀：坐立不安、流淚、流鼻水、打呵欠、出汗、發冷、肌肉痛、和瞳孔放大。

*胃腸道不良反應：腹痛、腹瀉、消化不良、胃炎。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/6/30 修訂】

BTC00EH20-02