

Febuxostat 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Febuxostat	Febuton®	達理痛膜衣錠	80 毫克/錠
	Feburic®	福避痛膜衣錠	

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

治療慢性痛風患者的高尿酸血症。不建議用於無症狀的高尿酸血症者。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 已知會對本藥活性成分或對任何賦形劑過敏者。

2. 正在使用 azathioprine(如本院藥品:Imuran 移護寧錠)或 mercaptopurine 的病人。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕、避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 本藥品可能會與其他藥品發生交互作用，就醫時請主動告知醫師您目前正在使用的所有藥品，或您正在服用該藥品，以利維護用藥安全。

2. 剛開始吃降尿酸藥時，因為體內尿酸結晶正在溶解移動，可能會短暫引發痛風，醫師會為您搭配消炎藥或秋水仙素來預防不適，請放心並堅持服藥。

3. 若您有其他疾病、懷孕或計畫懷孕或處於哺乳期，請告知醫師。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

*過敏：全身突發紅疹、嚴重搔癢；嘴唇、舌頭、眼皮或喉嚨明顯腫脹；或出現吞嚥困難、呼吸喘、聲音沙啞。

*心血管不適：突然胸悶、胸痛、呼吸困難、或是身體單側無力、口齒不清。

*肝功能異常：疲勞、食慾不振或尿液顏色變深。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

*噁心、關節痛。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/7/15 修訂】

BTC00E116-02