

Pancreatin 口服製劑衛教單張

學名	商品名	含量/劑型
Pancreatin	Pacrea Hard Capsules®	Amylase 18KIU, Protease 1KIU, Lipase 25KIU/ cap

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

囊腫性纖維化疾病、慢性胰臟炎、胰臟切除、胃腸繞道手術及因腫瘤引發胰管式膽管阻塞等疾病所導致的胰液分泌不全。

- ◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 整粒吞服膠囊或可打開服用，**應與酸性液體混合**：蘋果/柳橙/鳳梨汁，或與軟質食物混合：蘋果泥或酸奶。**立即吞服**混合物，切勿壓碎或咀嚼。

✚ 與**非酸性食物或液體混合**、碾碎或咀嚼顆粒**可能會刺激口腔**。

3. 服藥後，務必在正餐或加餐期間或之後，記得多喝點水。

- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 已知會對本藥活性成分或對任何賦形劑過敏者。
2. 對**豬肉**、任何豬肉製品或胰臟中的任何其他成分**過敏**。
3. **急性胰臟炎；慢性胰臟炎急性發作均禁止服用**。

- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量

- ◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

- ◆ **注意事項：**

1. 病患服用後如有任何異常的消化系統不適或原有不適症狀加重，請諮詢醫師。
2. 高溫會使消化效果會更快減弱。所以，服用胰酵素膠囊或藥粉時，**絕對不能配熱開水**，也不能撒在剛煮好的熱粥或熱湯裡。

- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

*過敏反應：出現嚴重的紅疹、蕁麻疹，或伴隨嚴重的搔癢。發現嘴唇、舌頭、眼皮或喉嚨有明顯的腫脹感。覺得胸口悶、呼吸不順、喘不過氣，或聲音突然變得沙啞。

*劑量過高可能導致高尿酸症。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

*噁心、嘔吐、腹瀉、脹氣、便秘、腹瀉、胃絞痛。

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/6/4 修訂】

BTC00EK34-02