

Repaglinide 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Repaglinide	Repaglinide	柔糖錠	1 毫克/錠
	Relinide®	糖立定錠	

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 短效型降血糖。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

2. 本藥品為「**隨餐服用**」，請於每餐開飯前 **15 分鐘**內服用(至多不超過餐前 **30 分鐘**)。請搭配進食習慣：有吃飯才吃藥，若少吃一餐(如不吃早餐)，請務必漏掉該次藥物不吃；若有增減餐次，請遵循醫師指示**隨餐調整服藥次數**。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 會對本活性成分或其他賦型劑過敏者。

2. 第一型糖尿病，C-peptide 呈現陰性的病人。

3. 糖尿病酮酸中毒者。

4. 嚴重肝功能異常者。

5. **避免與 Gemfibrozil(如本院藥品:洛脂膠囊)併用。**

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：**25°C**以下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服用此藥後，若需開車或操作機械，請留意低血糖風險(如頭暈、手抖)；如感不適，請立即停止操作並補充糖分以策安全。

2. 本藥品可能會與其他藥品發生交互作用，就醫時請主動告知醫師您目前正在使用的所有藥品，或您正在服用該藥品，以利維護用藥安全。

3. 本藥品在懷孕及哺乳期的安全性尚未完全建立。由於孕期血糖控制不良易增加胎兒畸形或生產風險，孕婦、計畫懷孕或哺乳期婦女使用前，請務必主動諮詢醫師。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

*過敏反應：全身突發紅疹、嚴重搔癢；嘴唇、舌頭、眼皮或喉嚨明顯腫脹；或出現吞嚥困難、呼吸喘、聲音沙啞。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/6/30 修訂】

BTC00EM09-02

Repaglinide 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Repaglinide	Repaglinide	柔糖錠	1 毫克/錠
	Relinide®	糖立定錠	

*低血糖昏迷與無意識：拍打叫喊無反應、無法喚醒，常伴隨臉色蒼白、全身大汗淋漓或肌肉抽搐。

*肝功能異常(罕見)：極度疲倦、吃不下飯、眼白變黃、尿液像濃茶。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

*輕微低血糖：肚子極餓、全身冒冷汗、手抖心慌，或覺得頭暈、視力模糊。

*腸胃不適：腹部疼痛、腹瀉、嘔吐與便秘。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/6/30 修訂】

BTC00EM09-02