

Semaglutide 注射劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Semaglutide	Ozempic®	胰妥讚注射劑	2mg/1.5ml/pen
			4mg/3ml/pen

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
第二型糖尿病。

◆ **用量與用法：**


1. 請遵循醫師指示使用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 通常一週一次，於每週同一時間皮下注射胰妥讚，**無需根據進餐時間給藥。**

*必要時可更改每週注射的日期，但兩次注射之間應至少相隔 3 天。選定新的注射日後，應安排後續每週注射一次。

✚ **注射步驟：**


- A. 用肥皂將雙手徹底洗乾淨後擦乾。
- B. 打開筆蓋，檢查注射液是否為**澄清無色且無任何異物**。
- C. 每次注射都必須使用新的針頭。請勿使用保護片破損、彎曲或已經受損的針頭。

1 步驟 1：消毒橡皮膜




以酒精棉徹底消毒注射筆前端的橡皮膜處，並靜待其自然風乾。

2 步驟 2：旋入針頭



撕去針頭保護紙，將針頭垂直緊密旋入注射筆上（務必保持垂直，避免針頭歪斜歪掉）。

3 步驟 3：取下外蓋並保留



取下針頭外蓋，置於一旁備用（※注意：請勿丟棄，注射完畢後需要用它將針頭安全套回並取下）。

4 步驟 4：移除內蓋（準備注射）



取下針頭內蓋並直接丟棄。此時細小針頭已外露，請小心勿觸碰任何地方，即可準備進行注射。

- D. 排空：**只有全新的注射筆才需進行排空步驟**。若針頭無出現液體，則再重複一次排空動作，最多 6 次。若仍無出現液體，請更換針頭。更換針頭後仍需進行排空動作。

5 步驟 5：調至排空符號



旋轉劑量選擇器，將劑量指針對準「流量檢查符號(--)」。

6 步驟 6：按壓並排空



將針頭朝上垂直握持，用大拇指按住注射鈕底。直到看見針尖出現至少一滴藥液，且劑量視窗回歸到「0」，即代表按壓並排空成功、針頭暢通，即可調整至醫囑劑量進行注射。



仿單查詢


本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/07/06 修訂】

BTC00EM41-02

Semaglutide 注射劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Semaglutide	Ozempic®	胰妥讚注射劑	2mg/1.5ml/pen
			4mg/3ml/pen

- E. 旋轉所需劑量與指示線對齊，當劑量調錯時可以相反方向調回正確劑量。
- F. 在預定注射部位，以酒精棉由內往外消毒，待酒精乾才可注射。
- G. 將針頭與皮膚成 90 度垂直注射，持續按住給藥按鈕直到劑量指示線與 0 對齊。
- H. 停留至少 6 秒再後拔出注射筆。若注射部位出血，請輕輕按壓止血，不要搓揉。
- I. 從針頭前端套入針頭外蓋，蓋住針頭後小心蓋緊針頭外蓋，旋轉取下針頭並丟入一個不易被刺穿的容器。滿桶後，再帶至可回收針頭的社區藥局或醫院注射室。
- ✚ **注射部位：**需輪換，可在同一區塊內接連注射，但注射針距間應保持一指寬。



手臂外側：上臂外側中1/3處，請避開上臂上1/3及靠近手肘處注射。

腹部：用拳頭將肚臍遮住，此範圍勿施打；往外約一個手掌寬的距離內注射。

大腿：大腿上段外側處，請避開大腿內側(神經血管多)及腹股溝。

◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：

1. 對藥物活性成分或任一賦形劑過敏
2. 本身或家族有甲狀腺髓質癌病史，或罹患第二型多發性內分泌腫瘤症候群的病人。

◆ 忘記注射藥物時該如何處理？

想起時若在 5 天內應儘快施打；若超過 5 天則應跳過，依原訂時程繼續注射下一劑，千萬不可一次注射兩倍劑量。

◆ 藥品儲存：

1. 未開封：2-8°C 冷藏。不可冷凍。依有效期限存放。
2. 已開封：存放於 30°C 以下或冰箱冷藏(2-8°C)，可保存 6 週(建議於筆身註記開封或到期日)。
3. 旅行時不可置於身上的衣服口袋及車內或飛機行李艙中。
4. 請勿冷凍胰妥讚，也不要使用冷凍過的胰妥讚。
5. 注射筆使用後必須套回注射筆蓋，以避免光線照射。

◆ 注意事項：

1. 若使用胰妥讚後出現嚴重嘔吐、腹瀉，請務必補充足夠水分，並密切注意是否出現口渴、尿量減少或頭暈等脫水徵象，以防影響腎功能，尤其是開始治療的頭一個月，但副作用多半會隨



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/07/06 修訂】

BTC00EM41-02

Semaglutide 注射劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Semaglutide	Ozempic®	胰妥讚注射劑	2mg/1.5ml/pen
			4mg/3ml/pen

時間而減緩。

2. 如果使用此藥之外還有服用其他降血糖藥物，請留意低血糖風險。若出現冒冷汗、雙手發抖、心跳加快、強烈飢餓感、頭暈或臉色蒼白，請馬上補充 **15 公克** 的糖分，如：**3~4 顆方糖**、半杯果汁或含糖飲料。如果已經嚴重昏迷，將病人側臥保持呼吸道暢通，並立刻撥打 **119** 送醫。
3. 若用藥後出現持續性劇烈腹痛，有時疼痛甚至延伸至背部，不論有無嘔吐，請立即停用胰妥讚並迅速就醫檢查是否為胰臟炎。
4. 如您曾有糖尿病視網膜病變史，使用胰妥讚時，可能因血糖快速改變而導致視網膜短暫惡化，應密切監測眼睛情況。
5. 本藥品在懷孕及哺乳期的安全性尚未完全建立。孕婦、計畫懷孕或哺乳期婦女使用前，請務必主動諮詢醫師。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

*過敏反應：全身突發紅疹、嚴重搔癢；嘴唇、舌頭、眼皮或喉嚨明顯腫脹；或出現吞嚥困難、呼吸喘、聲音沙啞。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

*噁心、腹瀉、嘔吐、消化不良、打嗝、頭暈等。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/07/06 修訂】

BTC00EM41-02