

Canagliflozin hydrate 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Canagliflozin hydrate	Canaglu®	可拿糖膜衣錠	100 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

第二型糖尿病。糖尿病腎病變。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 每日一次，於早餐前或早餐後口服。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 已知會對本藥活性成分或對任何賦形劑過敏者。
2. 重度酮病(ketosis)、糖尿病性昏迷或昏迷前期的病人。
3. 重度感染、手術前後、有嚴重外傷的病人。
4. 急性腎損傷或中重度腎功能不全、接受血液透析之末期腎衰竭病人。因這些病人使用本藥品並無法達到預期療效。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕、避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 本藥品可能會與其他藥品發生交互作用，就醫時請主動告知醫師您目前正在使用的所有藥品，或您正在服用該藥品，以利維護用藥安全。
2. 如果患者年紀較大、腎臟不好，或是有搭配吃利尿劑，吃這顆藥會更容易頭暈、血壓低，一定要多補充下水分。
3. 因此藥品會把血糖從尿液排出去，會順便帶走水分，所以上廁所的次數和尿量都會明顯變多。請多喝水防頭暈、脫水，並在如廁後擦拭乾淨以防私密處感染。
4. 如果除了服用此藥，同時還有使用胰島素製劑等其他降血糖藥物，請留意低血糖風險；若出現冒冷汗、雙手發抖、心跳加快、強烈飢餓感、頭暈或臉色蒼白，請馬上補充 15 公克的糖分(如：3~4 顆方糖、半杯果汁或含糖飲料)，但如果已經嚴重昏迷，切勿強行餵食，應立即將病人側臥以保持呼吸道暢通，並立刻撥打 119 送醫。
5. 若您有其他疾病、懷孕或計畫懷孕或處於哺乳期，請告知醫師。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/6/30 修訂】

BTC00EM51-02

Canagliflozin hydrate 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Canagliflozin hydrate	Canaglu®	可拿糖膜衣錠	100 毫克/錠

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

*過敏：全身突發紅疹、嚴重搔癢；嘴唇、舌頭、眼皮或喉嚨明顯腫脹；或出現吞嚥困難、呼吸喘、聲音沙啞。

*酮酸中毒：噁心嘔吐、劇烈腹痛、呼吸急促且有水果甜味。

*尿路敗血症與腎盂腎炎：發高燒、畏寒發抖、腰痛，或尿尿時劇烈刺痛、甚至血尿。

*會陰部壞死性筋膜炎(罕見)：會陰部(生殖器或肛門周圍)突然劇痛、紅腫、發燒。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

*生殖器黴菌感染：生殖器或會陰部極度搔癢、紅腫、刺痛。

*便秘、口渴。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/6/30 修訂】

BTC00EM51-02