

## Empagliflozin 口服製劑衛教單張

| 學名            | 商品名        | 中文名    | 含量/劑型   |
|---------------|------------|--------|---------|
| Empagliflozin | Jardiance® | 恩排糖膜衣錠 | 10 毫克/錠 |

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療第二型糖尿病、心臟衰竭及慢性腎臟病。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

2. 每天**早上**一次，可與食物一起服用，亦可空腹服用。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥成分或其他賦形劑產生過敏反應者，例如曾發生血管性水腫。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 30°C 以下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 本藥品可能會與其他藥品發生交互作用，就醫時請主動告知醫師您目前正在使用的所有藥品，或您正在服用該藥品，以利維護用藥安全。

2. 如果患者年紀較大、腎臟不好，或是有搭配吃利尿劑，吃這顆藥會更容易**頭暈、血壓低**，一定要**多補充下水分**。

3. 因此藥品會把血糖從尿液排出去，會順便帶走水分，所以上廁所的次數和尿量都會明顯變多。請多喝水防頭暈、脫水，並在如廁後擦拭乾淨以防私密處感染。

4. 如果除了服用此藥，同時還有使用胰島素製劑等其他降血糖藥物，請留意低血糖風險。若出現冒冷汗、雙手發抖、心跳加快、強烈飢餓感、頭暈或臉色蒼白，請馬上補充 15 公克的糖分，如：3~4 顆方糖、半杯果汁或含糖飲料。如果已經嚴重昏迷，將病人側臥保持呼吸道暢通，並立刻撥打 119 送醫。

5. 若您有其他疾病、懷孕或計畫懷孕或處於哺乳期，請告知醫師。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

\*過敏反應：全身突發紅疹、嚴重搔癢；嘴唇、舌頭、眼皮或喉嚨明顯腫脹；或出現吞嚥困難、呼吸喘、聲音沙啞。

\*酮酸中毒：噁心嘔吐、劇烈腹痛、呼吸急促且有水果甜味。

\*尿路敗血症與腎盂腎炎：發高燒、畏寒發抖、腰痛，或尿尿時劇烈刺痛、甚至血尿。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/6/30 修訂】

BTC00EM52-02

**Empagliflozin** 口服製劑衛教單張

| 學名            | 商品名        | 中文名    | 含量/劑型   |
|---------------|------------|--------|---------|
| Empagliflozin | Jardiance® | 恩排糖膜衣錠 | 10 毫克/錠 |

\*會陰部壞死性筋膜炎(罕見)：會陰部(生殖器或肛門周圍)突然劇痛、紅腫、發燒。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

\*生殖器黴菌感染：生殖器或會陰部極度搔癢、紅腫、刺痛。

\*低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)些微上升。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/6/30 修訂】

BTC00EM52-02