

Dinoprostone 陰道塞劑衛教單張

學名	商品名	含量/劑型
Dinoprostone	Glandin-E2 [®]	3 毫克/錠
	Prostin E2 [®]	

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

對經產婦或順產婦之引產有效。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示使用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 本藥是由醫護人員在醫院為您置入陰道使用，您不需自己服用或塗抹。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 多胎妊娠。
2. 多胎史(曾有六次或六次以上足月懷孕者)。
3. 胎兒頭部尚未進入產位。
4. 曾動過子宮手術者(剖腹產、子宮切開術)。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：儲存於 2~ 8℃。

◆ **注意事項：**

1. 如有心血管功能異常、肝腎功能損害、氣喘、青光眼或眼內壓升高、羊膜及絨毛膜破裂、癲癇或有癲癇病史者，應小心使用。
2. 使用本藥期間，醫護會持續監控子宮活動及胎兒心跳速率。
3. 媽媽的肚子會有顯著的酸痛或背痛感，陰道會有些溫熱或灼熱感，有時會伴隨輕微的噁心、嘔吐、腹瀉或身體微熱。
4. 若有肚子異常緊繃、劇痛、喘不過氣、眼睛不適、或頭暈頭痛，請立刻按護理鈴。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即通知醫護

*過敏：全身突發紅疹、嚴重搔癢；嘴唇、舌頭、眼皮或喉嚨明顯腫脹；或出現吞嚥困難、呼吸喘、聲音沙啞。

*呼吸症狀：突然覺得呼吸困難、喘不過氣或胸悶。

*子宮過度刺激：肚子持續緊繃完全沒有放鬆，或是出現無法忍受的異常劇痛。

*神經與眼部症狀：突然感到嚴重的頭暈、劇烈頭痛、或眼睛視力模糊、眼壓高不舒服。