

Brinzolamide/ Brimonidine 眼用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Brinzolamide/ Brimonidine	Simbrinza	勝克壓複方點眼液	B 10 毫克/毫升, B 2 毫克/毫升, 5 毫升/瓶.

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

治療曾使用單方治療效果不佳的隅角開放性青光眼或高眼壓成人患者，以降低其眼內壓。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示使用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 如有佩戴隱形眼鏡，在使用前先取下，並在滴入點眼藥水後，約等待 15 分鐘再重新戴回。
3. 將藥水搖勻(白色至乳白色的懸液劑)。藥量多半約每天 2 次，一次 1 滴。
4. 頭部後仰(或平躺)，輕拉下眼瞼將藥水點入結膜囊(下眼皮與眼球間的溝槽)。點藥後閉眼 1 到 5 分鐘，同時用手指輕壓眼內角(淚囊處)後再張開眼睛。

******輕壓眼內角(淚囊處)可以阻斷藥液流進鼻淚管、進入喉嚨或全身循環，能有效減輕全身性副作用：呼吸抑制或血壓失控。

5. 用畢，蓋上瓶蓋，若有流至眼睛周圍之眼藥水或淚水可用紙巾擦拭乾淨，使用後再洗手。

☒ 同時使用多種眼藥水時，記得兩者要間隔 5 分鐘以上。如果是眼藥水和眼藥膏搭配使用，請遵循『先水後膏』的原則：先滴眼藥水，休息 10 分鐘後再塗抹藥膏。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥品或本身對磺胺類藥物過敏者。

******brinzolamide 是一種磺胺類藥物，若出現全身性吸收，可能會發生磺胺衍生物的過敏反應。

2. 接受單胺氧化酶抑制劑(MAOI)治療的病人。像是某些抗憂鬱藥或帕金森氏症。
3. 重度腎功能不全病人。
4. 高氯血酸中毒的病人。
5. 新生兒與未滿 2 歲的嬰幼兒。

◆ **忘記使用時該如何處理？**

想起時盡快使用，若接近下次給藥時間，按時使用下次劑量即可，不需要多點眼藥水。

◆ **藥品儲存：**

1. 室溫 25°C 以下陰涼處，避光、避濕及避熱。
2. 開瓶後最多只能存放 4 週，逾時請丟棄。
3. 將藥品放在孩童拿不到的地方，勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 使用後可能導致眩暈、疲倦和/或嗜睡，應等到視力清楚才可繼續駕駛或操作機械。
2. 請務必加強按壓眼角。眼藥水可能讓心跳變慢或血壓降低，若與您的血壓藥產生加成效



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/6/4 修訂】

BTC00EV50-02

Brinzolamide/ Brimonidine 眼用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Brinzolamide/ Brimonidine	Simbrinza	勝克壓複方點眼液	B 10 毫克/毫升, B 2 毫克/毫升, 5 毫升/瓶.

用，可能導致頭暈或疲累。

3. 如有在服用阿斯匹靈、止痛藥、憂鬱症藥物或帕金森氏症藥物，請在門診時主動告知醫師。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

*過敏反應：眼睛極度紅腫、發癢、皮疹、甚至呼吸困難。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

*味覺障礙、口乾、視力模糊、眼睛刺激。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/6/4 修訂】

BTC00EV50-02