

Propylene Glycol 眼用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Propylene Glycol	Systane Complete Lubricant	視舒坦康復力人工淚液點眼液	6 毫克/毫升, 10 毫升/瓶

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示使用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
 2. 使用前請先將手洗淨擦乾。
 3. 請先搖晃下眼藥水再打開瓶蓋。
 4. 頭部後仰(或平躺)，輕拉下眼瞼將藥水點入結膜囊(下眼皮與眼球間的溝槽)。點藥後閉眼 1 到 5 分鐘，同時用手指輕壓眼內角(淚囊處)後再張開眼睛。
 5. 需要時通常 1 次 1 至 2 滴。
 6. 用畢，蓋上瓶蓋，若有流至眼睛周圍之眼藥水或淚水可用紙巾擦拭乾淨，使用後再洗手。
- ☒ 同時使用多種眼藥水時，記得兩者要間隔 5 分鐘以上。如果是眼藥水和眼藥膏搭配使用，請遵循『先水後膏』的原則：先滴眼藥水，休息 10 分鐘 後再塗抹藥膏。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

曾因本藥成分引起過敏者。

◆ **忘記使用時該如何處理？**

想起時盡快使用，若接近下次給藥時間，按時使用下次劑量即可，不需要多點眼藥水。

◆ **藥品儲存：**

1. 室溫 25°C 以下陰涼處，避光、避濕及避熱。
2. 開瓶後最多只能存放四週，逾時請丟棄。
3. 藥液變色或出現異物時請丟棄。
4. 將藥品放在孩童拿不到的地方，勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 若連續使用 3 天症狀仍未改善，或點藥後出現視力模糊、眼睛劇痛、紅腫加劇等異常現象，請立即停藥並回診諮詢眼科醫師。
2. 因為含油滴，不能戴著隱形眼鏡時直接點，會使鏡片模糊，必須在戴前或摘除後使用。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

*過敏反應：眼睛極度紅腫、發癢、皮疹、甚至呼吸困難。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/6/3 修訂】

BTC00EV53-02