

Tobramycin 眼用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Tobramycin	Tobacin	特百欣眼藥水	3 毫克/毫升；5 毫升/瓶

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

眼睛感染及眼附屬器官的感染，對於一般抗生素有抗性的細菌感染症。

- ◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示使用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
 2. 使用前請先將手洗淨擦乾。
 3. 不建議於使用期間配戴隱形眼鏡，若需配戴應在使用前取下隱形眼鏡，用完眼藥水後等待至少 15 分鐘後再戴回。
 4. 請先搖晃下眼藥水再打開瓶蓋。
 5. 頭部後仰(或平躺)，輕拉下眼瞼將藥水點入結膜囊(下眼皮與眼球間的溝槽)。點藥後閉眼 1 到 5 分鐘，同時用手指輕壓眼內角(淚囊處)後再張開眼睛。
 6. 輕度至中度病況：每 4 小時點 1-2 滴於感染的眼睛。
 7. 嚴重的病況：每 1 小時點 2 滴至明顯見效為止，其後即減少用量，使用至完全治癒為止。
- ☑ 同時使用多種眼藥水時，記得兩者要間隔 5 分鐘以上。如果是眼藥水和眼藥膏搭配使用，請遵循『先水後膏』的原則：先滴眼藥水，休息 10 分鐘 後再塗抹藥膏。

- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

對本藥成分或賦形劑過敏者。

- ◆ **藥品儲存：**

1. 室溫 25°C 以下陰涼處，避光、避濕及避熱。
2. 開瓶後最多只能存放 4 週，逾時請丟棄。
3. 將藥品放在孩童拿不到的地方，勿將此藥送予他人服用。

- ◆ **注意事項：**

1. 若使用眼藥水後出現視力模糊，請待視力清楚後再駕駛或操作機械。
2. 本藥水與「四環黴素」類藥物併用可能會降低藥效。若您正在使用其他眼藥，請務必主動諮詢醫師。

3. 臨床試驗證實特百欣眼藥水可用於孩童。

- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

*過敏反應：眼睛極度紅腫、發癢、皮疹、甚至呼吸困難。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

*眼睛灼熱感、刺痛感。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/06/04 修訂】

BTC00EV54-02