

Pilocarpine 眼用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Pilocarpine HCL	Pilocarpine	鹽酸毛果芸香鹼眼藥水	2%, 15 毫升/瓶

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

縮瞳劑、用於治療原發性隅角開放性青光眼和急性隅角閉鎖性青光眼。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示使用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 使用前請先將手洗淨擦乾。
3. 打開瓶蓋，頭部後仰(或平躺)，**輕拉下眼瞼將藥水點入結膜囊**(下眼皮與眼球間的溝槽)。點藥後閉眼 **1 到 5 分鐘**，同時**用手指輕壓眼內角**(淚囊處)後再張開眼睛。
- ★★ 用手指輕壓眼內角(靠近鼻樑處)約 **2 至 3 分鐘**，可以阻斷藥液流進鼻淚管，進入喉嚨或全身循環，能有效減輕全身性副作用。
4. 1 天可用 **3 至 4 次**，1 次 **1 至 2 滴**。
5. 用畢，蓋上瓶蓋，若有流至眼睛周圍之眼藥水或淚水可用紙巾擦拭乾淨，使用後再洗手。
- ☑ 同時使用多種眼藥水時，記得兩者要間隔 **5 分鐘以上**。如果是眼藥水和眼藥膏搭配使用，請遵循『先水後膏』的原則：先滴眼藥水，休息 **10 分鐘**後再塗抹藥膏，藥效吸收才會更好。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對此藥過敏者。
2. 會造成瞳孔收縮，不希望縮瞳(如急性虹彩炎)者，禁止使用本劑。

◆ **忘記使用時該如何處理？**

想起時盡快使用，若接近下次給藥時間，按時使用下次劑量即可，不需要多點眼藥水。

◆ **藥品儲存：**

1. 室溫 **15~30°C** 以下陰涼處，避光、避濕及避熱。
2. 開瓶後最多只能存放一個月，逾時請丟棄。
3. 將藥品放在孩童拿不到的地方，勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. **氣喘患者請慎用**，因本藥可能加重氣喘症狀。
2. 對於孕婦或可能已懷孕婦女，非必要請勿使用，因本品可能引起子宮肌肉的收縮。
3. 點藥後因瞳孔縮小，夜間視力會明顯變差，點藥期間**夜間開車或走動請特別注意安全**。
4. 點藥初期可能會出現短暫的眉毛上方局部疼痛(睫狀肌痙攣引起)或視力模糊，通常一陣子後會緩解。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/6/4 修訂】

BTC00EV55-02

Pilocarpine 眼用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	規格
Pilocarpine HCL	Pilocarpine	鹽酸毛果芸香鹼眼藥水	2%, 15 毫升/瓶

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- *過敏反應：眼睛極度紅腫、發癢、皮疹、甚至呼吸困難。
- *全身反應(少見)：呼吸困難或氣喘、心跳過緩或暈厥、嚴重的肌肉抽動或無力。
- *白內障(少見)：長期用藥後發現視力逐漸模糊、畏光。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

- *眼睛不適：結膜充血(眼睛紅)。
- *腸胃不適：下痢、噁心或嘔吐。可能有發汗、流涎等現象。



仿單查詢

本單張無法詳載此藥所有藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請查閱仿單或詢問您的醫師或藥師

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2026/6/4 修訂】

BTC00EV55-02